Metz & Comp. in Berlin

Pinienstrusse 132 (nuhe dem Oranienburger Thore).

Besitzer der Steglitzer Samengärten, Versuchsfelder und Baumschulen.

II. Theil.

Preis-Verzeichniß

II. Theil.

Gemüse und Blumen Sämereien

einem Auszug aus dem Pflanzen= und Banmichulen=Katalog.

ece Inhalt: 930

| | Gert |
|--------------------------|------|
| Gemufe: Jamen. | |
| Sulfenfrüchte | 2-3 |
| Rohl | 3-4 |
| Robirabi über ber Erbe | 4 |
| Robirnben oder Stedrüben | 4-5 |
| Radies und Rettig | 5 |
| Ruben und Burgeln | 5-6 |
| 3wiebeln und Borree | 6 |
| Salat | 6-7 |
| Spinatforten | 7 |
| Gurfen, Delonen, Rurbis | 7-8 |

| | | | 1 | | | | | Seite |
|---|-----------------|------|-----|------|------|------|----|-------|
| | Rüchenfräuter | | | | | | | 8 |
| | Stedgwiebeln . | | | | | | | 8 |
| | Ausbauernbe R | ñche | nge | wä | dife | | | 8 |
| | Rartoffeln | | 1. | | | | | 8-9 |
| | Cucurbitaceen . | | | | | | | 9 |
| 2 | lumen, Bierg | grä | ier | | | | 9 | -20 |
| | Gehölzfamen . | | | | | | 20 | -21 |
| | Grasmifdunge: | n fü | r 9 | Raf | enpl | äķe | 21 | -22 |
| 9 | tachtrag, die | Ne | uh | eit | en | für | | |
| | das Jahr | 186 | 8 | und | ei | nige | | |
| | andere Same | en e | nth | alte | nd. | | 22 | -24 |
| _ | | | _ | _ | | | _ | |

| the state of the same of | Geite |
|-----------------------------------|-------|
| Mudging aus bem Pflangen: und | |
| Baumichulen: Ratalog 2 | 4-31 |
| Dbftbaume ac., Beerenobft , Bier- | |
| baume und Strauder, Rofen, | |
| Georginen, Bladiolen, Belargo- | |
| nien, Pflangen jum Bepflangen | |
| von Gruppen, diverfe Rnollen ac. | |
| enthaltenb. | |
| Grasfamen für Garten | 31 |
| Inhana | 21 |

Bu gleicher Zeit wird ausgegeben:

- I. Theil. Berzeichniß über Sämereien 2c. für die Landwirthschaft und Forstwirthschaft.
- III. Theil. Bflanzen= und Baumschulen=Berzeichniß mit praktischen Bemerkungen.

Ende Februar erscheint:

IV. Theil. Nachtrag zu unseren Katalogen über erst in biesem Frühjahr in ben Sanbel kom= mende Neuheiten 2c.

Ende Juli erscheint:

V. Theil. Berzeichniß über Saatgetreide und andere Herbstfamen, über Blumenzwiebeln 2c.

Die von uns gesammelten Berichte über Nutpflanzen, (Berlag: Biegandt & Bempel), 9. Jahrgang, erscheinen Ende Januar und sind durch jede Buchhandlung, wie auch durch uns zu beziehen. Preis 18 Sgr.

Bemerfungen.

Die Preise gelten (bei baarer Zahlung) für frübzeitig eingehende Auftrage, für spätere tann eine Erhöhung, oder auch eine Ermäßigung eintreten; bei Abnahme von weniger als 25 Pjund oder 4 Megen treten die Pjundpreise ein, von weniger als 1/4 Pjund die Bothpreise. Emballage wird besonders berechnet.
Anstrage und Gelder erditten franco. Den Bestellungen bitten wir, sofern nicht eine andere Vereindarung vorangegangen, entweder den Betrag oder eine Angahlung beignsigen und mis zu gestatten, den Archbetrag dem Ente nachzunehmen.
Um recht bentliche Angabe des Nameus, des Wohnorts, der nachften Post- oder Gisenbahuflation, wie der Art der Jusendung, wird gang ergebenft gebeten.

ere Gemüse:Samen. Me

Biele der hier angebotenen Sorten sind von uns selbst mit angemessener Sorgialt gebaut, andere, für welche sich unser Boden nicht günstig zeigte, oder welche ersahrungsmäßig in bestimmten Gegenden ihre höchste Vollkommenheit erlangen, aus uns genau bekannten Quellen, siber deren Solidität uns die alljährlichen Resultate unserer Probeselder Sicherheit geben, bezogen.

| Sicherheit geben, bezogen. | *** | | 9 | | | | | | | |
|--|------|-----|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| Erbsen. | Sgr. | | Pahlerbse, Mark-runglige. | - 1 | T | | | | | |
| | 3 | | Britanniens Aputatu | 5 | | | | | | |
| Pahlerhie, frühe Mai-, 3 Fuß h. 100 Pfd. 8½ Thr. frühe Wettrenner-, 100 Pfd. 8 Thir. | 3 | | 34 guß boch, febr fpat und fich lange fuß erhaltend. | 4 | | | | | | |
| " friihe Wettrenners, 100 Pfo. 8 Ehir. " Prince Albert, friiheste, 38ch. 100 Pfo. 8 Ehir. | 3 | | " Champion of England 2½ Buß hoch, mittelfrub, bis zu 10 Körnern in einer | - | | | | | | |
| " Bishops, medrige volltragende 13 F. hoch | | | Schote. | _ | | | | | | |
| " Bilhops, medrige bouttugenst 1/2 8. Thir. | 3 | | Fairbaird's unvergleichliche, 3 Fuß hoch | 5 | | | | | | |
| " Daniel D'Rourte, allerfrüheste, sehr zu em- | | 2.1 | Mammuth, niedrige grune | 6 | | | | | | |
| " " Daniel D stoutet, att. h. 100 Kfd. 8 Thir. | 3 | | Veitch's Perfection | 6 | , | | | | | |
| d'Anvergne ou sernette | 5 | | neu. Gang vorzügliche Erbje, sie verzweigt fich febr ftart, besonders auf etwas ichwerem fraitigen Boben, und | | | | | | | |
| all or the singuithmentich conditate, DIS O MULLEL | | | harf haber nicht zit end delegt werden, ite it mittelling | | | | | | | |
| baltende Schoten. Dieje Stie genotig reichtragenb | | 110 | und gatt fich fest tange wohrtchmeache. | 7 | | | | | | |
| und butlie lich lut ben Gerebut em Graben | | | " Prince of Wales " Neu. 11/8 Bug boch, in freier Lage bedarf sie, geftührt | 4 | | | | | | |
| Emperor delikat Gine ber empfehlenswertheften, | 0 | | | | | | | | | |
| 24 Fuß hoch, 100 Pfd. 8 Lytt. | 3 | • | | | | | | | | |
| Rooks Gem oder Tom Thumb | 20 | | Sammtliche Mart-Grifen eignen fich gur fruhen und fpaten Aussauel Gie find im Allgemeinen feiner als internet aussen besonders aum Gin- | | | | | | | |
| Gine neue, wirklich gang niedrige, nur ein paar | | 1 | Die ubrigen Sotien und ibetben befondets ginn | | | | | | | |
| Boll hohe reichtragende Erbse. Burbridge's Eclipse, 1½ Fuß hoch | 5 | | Budererbie, frühe große engl. Gabel-, 5 F. hoch | 8 | | | | | | |
| "Harrison's Glory prolific, sehr früh | 5 | | späte " " 4" " | 8 | | | | | | |
| Lawton's Prolific early long Dod. | 20 | | bolland. " 5 " | 8 | | | | | | |
| | | | Vilmorins Knight Marrow . | 10 | | | | | | |
| Neu. Eine vorzugliche reichtragende Gotte, mit 1997 [angen Schoten, welche häufig 12 Körner enthalten, mittelfrüh, 4 Buh boch. | 1 | | Die naue im narigen Jahre in den handel gefommene | | П | | | | | |
| Folger=, 3½ Fuß hoch | 4 | ٠ | erste Mart-Budererbie fann nicht genug empfohien mer- ben. Sie tragt ungemein reich und vereinigt alle Bor- | 1 | | | | | | |
| tude nain de Brétagne | 5 | | luge der Buder- und Matte Pagietole. | 10 | | | | | | |
| " man 1 Bub hoch und pon ben Zwergerbien Die bous | | | niedrige, de Grace, 1/8. h. z. Ereiben | 12 | | | | | | |
| tragenbste. Kann nicht genug empfohlen werben. " niedrige Burbaum- | 4 | | nene große Ittelens, o gruß h | 0 | | | | | | |
| " Schnabel=, große, sehr gut und ungemein | | | Rothblübend. Schoten über 4 3oll lang, wirklich riefig. In einer Versammlung bes Gartenbauvereins, wo solche | | | | | | | |
| " volltragend, 4 Fuß hoch | 4 | ٠ | andaeleat maren, erredien ile augemeines augeven- | | | | | | | |
| Honia-, vorzäglich, 4 Kuß hoch | 5 | · | frummjajorige mit wachsgew. Schoten | 5 | | | | | | |
| " Schwedische Mammuth | 7 | -6 | Spargels oder Flügels, 1 Fuß hoch | 0 | | | | | | |
| Erhie des Meherfluffes | 1 | | Gignet fich gu Ginfaffungen. | | | | | | | |
| 4 guß boch, Schoten gabtreich und fehr reichfornig. | 4 | | Feld-Erbsen. | - | | | | | | |
| Dickson's Favorite, zu empfehlen Victoria, späte große engl., 5—6 Fuß hoch | 4 | | | 0 | | | | | | |
| "Gold= oder Wachs=, späteste, 3 Fuß hoch | 4 | | Weiße Riesen=, 100 Bfd. 5½ Thir | 1 4 | ï | | | | | |
| Cahr in amntchlende liablerbie. | | | | | | | | | | |
| " grünbleibende Caper=, altbewährte, vorzüg= | 2 | | fich gegen ungunftige Witterungseinfluffe weniger em- pfindlich als andere gute Varietaten zeigt. | | | | | | | |
| liche Gorte | 10 | 11 | Große frühe gelbe Klunkers, 100 Pfd. 6 Thir. | 2 | | | | | | |
| " Sutton's Ring leader Peas, 3 Fuß hoch. "Eine als neu von England aus emplopiene Sorte, | | | Gebr reichtragend und blattreich. | 11 | | | | | | |
| hie other noth four to aut als Daniel O Roule. | | | Rleine fruhe grune. Breis pro Bifpel und Scheffel veranderlich | | | | | | | |
| Morts. Alliance, weige pair Siverys, | 5 | | Om Garnevertrage mie im Gefchmad gebort fie ju ben | 1 | H | | | | | |
| 2 Fuß boch, vom zweiten Blatte ab blugeno. | 2 | 6 | norzhalichiten. Abrer augerorbentitt gettigen Gutibia. | | | | | | | |
| " Baradies, frühe 100 Bfb. 9 Thir. | 3 | 0 | lung wegen befallt sie jelten. | W. | | | | | | |
| Peabody's ipate Zwergs, 4-1 out | 00 | | Große späte grüne. Preis pro Wispel und | 2 | | | | | | |
| hoch, wirtlich fpat, gu empfehlen Daburch, bag bie Schoten nur bicht gebrangt an ber | | | Scheffel veränderlich | | 3 | | | | | |
| Spige ber Bflange figen, befommt biefe Erbfe ein hochft | | | tragende Rocherbfe. Gie machft üppiger als die vorige | | | | | | | |
| eigenthümliches Unsehen. | 1 | | Es ist eine ebenfalls sehr empfehlenswerthe reichtragende Kocherbie. Sie mächst üppiger als die borigi und reift 14 Tage pater. | 4 | | | | | | |
| " " runglige, Knight's niedrige weiße, bor- | 5 | 1. | Graue franzostate im närdlichen Deutichland mehrfach aus | , | | | | | | |
| 3siglich, ungemein reichtrag., 3 F. hoch | - | 1 | mahrend aus milberen Gegenden bie Berichte gunftiger | r | | | | | | |
| " " Rnight's hohe weiße, 6 Fuß hoch | 20 | 1 | lauten | | | | | | | |
| neue von England aus empfohlen Mart-Erbie, welch | 2 | | Gewöhnliche frühe gelbe Breis pro Wifpl. und Gewöhnliche späte gelbe Schfil. verand. | TOTAL PROPERTY. | | | | | | |
| 3 guy boch wirb, reichtrageno ift und fich tange fab 4400 | 1916 | 100 | | | | | | | | |
| Nonpareille, niedrige grine, 3 F. hog | 5 5 | 010 | Erbien bei Abnahme großerer Auantituten tichtet fic | 1 | | | | | | |
| " " " hohe grüne, 5 Fuß boch | 0 11 | 1 . | and the state of t | | | | | | | |
| | | | - 7.6x A F Z | | | | | | | |

BOTA 39 163

| Bohnen. | 10 fti Sgr. | | Musakahaan | 1 | Pfui Sgc | |
|--|--|-----|--|---|--|---|
| Stangenbohnen, große, lauge br. weiße Sch | | | Buschhein. | | Office | 418 |
| Schlachtschwert, mit 12—14" langen Sch | | | " Tanbenaugen-, Salatreiserbohne von | pen | 0 | |
| fehr früh und volltre | | | Nzoren. Neu | Qa. | 6 | • |
| " kleine weiße Zuder-Berl, gang ohne F | | | pan. Nen | Au. | 7 | |
| " " " " Bachs-, neu | | | " gelbe Strauchsalat=, aus Schottland. | | 6 | |
| " große weiße dichotige rheinische 3 | ncter= | | " Isienburger, früheste volltragende bin | | 0 | • |
| Säbel-L | | | 100 Ffb. 8% | 261. | A | |
| " weiße von Soissons, zu empfehlen | 5 | | Cie wird somohl jum Treiben wie jum Unbe | eljii. | 4 | ۰ |
| " weiße Zuder= oder Butter= | 6 | .] | rauhen Gebirgegegenden empfohlen. | | | |
| Die bewährteste gum Ginmachen. | | | " frühe Pariser, runde gelbe, die allerfriil | heste. | 4 | |
| " Riefen-Buder-Brech-, extra schön | | | vorzuglich zum Erodenkochen. | | | |
| " Riefen-Zuder-Brech- mit wachsgelben & | | 0 | Mit Unrecht finden im Allgemeinen die farbigen ten weniger Berwendung, obgleich die meisten ber | Cor. | | |
| und weißen Bohnen, ganz extra | | 6 | fehr ergiebig find und bor den weißen Gorten fich | burch | | |
| " Römische Wachs-, ganz ohne Fasern Meistens mit weißen Schalen. Wibersteht ber T | 8 | | größere Widerftandefähigfeit gegen ungunftige 2 | Bitte= | | |
| heit sehr gut. | t buen- | | rungsverhaltniffe auszeichnen. | 0.00 | | |
| " große weißschalige Wachs- von Al | gier. 9 | | Buffbohnen, Erfurter gewöhnl. pr. 100 Bfd. | | 3 | • |
| Früher als die vorige und fehr volltragend. lang und breit, fehr fleifchig; eine gang vorg | Sülfen | 10 | " Johnson's wundervolle englische | 0 00 | 4 | ٠ |
| Brechbohne. | ugliche | | " Windsor-, große breite 100 Pfd. | | 4 | ۰ |
| aus der Krim (Wolfsbohne) | 5 | . 1 | " Monarch, mit sehr langen Schoten 100 Pfd. | | 4 | ۰ |
| Bachit febr ftart und eignet fich, außer baß | fie ben | | " Mailänder, grüne | | 4 | ۰ |
| Witterungeeinfluffen beffer als andere widersteht reich tragt und ein wohlschniedendes Gemufe liefe | , jehr | - 1 | Murbe zu hoben Preisen als verennirende Bobne | ดูกลิะ | O | ٠ |
| Befleidung von Lauben und anderer hoher Wegen | ftände. | | Burbe zu hoben Preisen als verennirende Bohne geboten. Die erwähnte Eigenschaft hat fie be | i uns | | |
| " neueste blauschotige Spect = (Phas | eolus | 12 | zwar nicht gezeigt, dagegen verdient fie als fehr | poll= | | |
| " neueste blauschotige Speck- (Phas Lucasianus) à Loth 2 | Sgr. | 10 | tragende Sorte weitere Beachtung. | | | |
| Dit iconen duntelblauen Schoten und gel | blichen | | Keld-Bohnen. | | | |
| Bohnen; eine äußerft delikate und fehr ertra Sorte. Die Blüthen find ebenfalls violet. | greitge | | | | | |
| " Türkische Feuer= oder Prunt= | 5 | . 1 | Buschbohne, weiße Magdeburger 100 Bfd. 6% | Sic. | 3 | |
| , " zweifarbige | 6 | | Ungemein volltragend und fruh reifend. | Your | | |
| neiße | 5 | | Pferdebohne, gewöhnliche, Preis pro Wind Scheffel verände | riper | 2 | c |
| " Weiße Bettere Sorten muffen da Erfat bieten, wo ein beres Klima das Gedeiben anderer Bohnen hinder | n rau- | 18 | " schottische, | | 3 | O |
| | The second second | - 1 | Sat fich an mehreren Orten vor ber unfrigen | aus. | J | ٠ |
| Bufdbolnen, große lange breite weiße Schi | wert=, | - 1 | gezeichnet. | | | |
| | | | | | | |
| ertra | 4 | . 1 | Rinfen | | | |
| früheste hollandische weiße Schwert-, | gum 4 | | Linfen. | mrs | | |
| früheste hollandische weiße Schwert-, | gum 4 | i | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 | C 60 | 9 | C |
| " früheste holländische weiße Schwert», Treiben besonders gern angewendet , " hodistandige, extra lange breite i | weiße 4 | | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 | C 60 | 2 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet " hochstaudige, extra lange breite i Schlachtschwerts | weiße 5 | . 6 | Gewöhnliche weiße (nach bem Marktpreis) 100 Heller- 100 Bfb. | 6 R. 9 R. | 3 | |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet, hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie | weiße 5 | . 6 | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 | 6 R. 9 R. | 3 | |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet, hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie | weiße 5 | . 6 | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 RG 9 RG 0 RG | 3 4 | 6 |
| " früheste holländische weiße Schwert», Treiben besonders gern angewendet " hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert» Haricot nain de Hongrie Gine unendlich reichtragende neue Spie Stauden sind ziemlich boch, die Hilfen find | weiße 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 Heller-, 100 Pfd. Schwarze, 100 Pfd. 1 | 6 Re 9 Re 0 Re Pfund | 3 4 | 6 |
| " früheste holländische weiße Schwert», Treiben besonders gern angewendet " hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert» Haricot nain de Hongrie Gine unendlich reichtragende neue Spie Stauden sind ziemlich boch, die Hilfen find | weiße 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 Heller-, 100 Pfd. Schwarze, 100 Pfd. 1 | 6 Re 9 Re 0 Re Pfund | 3 4 | 6 |
| " früheste holländische weiße Schwert», Treiben besonders gern angewendet " hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert» Haricot nain de Hongrie Gine unendlich reichtragende neue Spie Stauden sind ziemlich boch, die Hilfen find | weiße 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (nach dem Marktpreis) 100 Heller=, | 6 Re 9 Re 0 Re Pfund | 3 4 | 6 |
| "früheste holländische weiße Schwert», Treiben besonders gern angewendet "hochstaudige, extra lange breite is Schlachtschwert» "Haricot nain de Hongrie "Eine unendlich reichtragende neue S Die Stauden sind ziemlich boch, die Hilfen sin böchtend 2 Joll lang und febr körnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sont eigne die Schoten, ihrer Aleinbeit wegen wie keine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gefocht ungemein zart. Kann | weiße 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, 100 Pfd | 6 Re 9 Re 0 Re Pfund | 3 4 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert Haricot nain de Hongrie. Gine unendlich retchtragende neue Die Stauden sind ziemlich boch, die Hilfen höchstend 2 30d lang und sebr könnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechdohne, sonst eigne die Schoten, ihrer Aleinbeit wegen wie keine zum Einnachen, die trochnen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werden. | meiße 5 12 sorte. sid nur zu aft en sich andere rein- i nicht | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sm 4 . 7 15 | 3 4 \$00 \$9 | 6 |
| "früheste holländische weiße Schwert», Treiben besonders gern angewendet "hochstaudige, extra lange breite is Schlachtschwert». "Haricot nain de Hongrie | weiße 5 12 sorte. b nur 3,34 aft en fich andere rein-1 nicht | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 R6 9 R6 0 R6 1 Sgr 4 . 7 15 | 3 4 \$00 \$9 | 6 . th 2/19 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- "Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Sie Studen sind ziemlich doch die Historia den in böchstens 2 30 ll lang und sehr körnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eigne die Schoten, ihrer Aleinbeit wegen wie feine zum Einmachen, die trochnen, nur wickengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werden. "Hundert sitr Sine "frisheste Sechswochen-, neu. | weiße 5 12 sorte. b nur 3,3 u alt en sich andere rein 1 nicht 4 8 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, 100 Pfd | 6 R6 9 R6 0 R6 1 Sgr 4 . 7 15 | 3 4 5 5 9 | 6 . th 2/19 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet " hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- " Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hilfen sin böchstend 2 301 lang und febr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empsohlen werden. " Hundert sitr Gine " frisheste Sechswochen-, neu. " gelbe Zucker- " große feine weiße Zucker- oder Butter- | weiße 5 12 5 orte. 12 3 orte. 12 3 orte. 12 4 orte. 16 5 orte. 12 5 orte. | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 . 7 15 | 3 4 5 5 9 5 5 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert Haricot nain de Hongrie. Gine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemtich hoch, die Hilbe bie Schoten. ihrer Rieinbeit wegen wie feine zum Einmachen, die trochen, sonst eine zum Einmachen, die trochen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind zeschen, nur widengroßen, genug empfoblen werben. Hundert sir Gine grißes Sucker- große seine weiße Zucker- oder Butter- große seine weiße Zucker- ganz klein | weiße 5 12 forte. b nur 3 nu aften fide anubere rein 1 nicht 4 8 5 5 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, 100 Kfd. Schwarze, 100 Kfd. Lohl. Vlumentohl, Affatischer großer später. Berliner früher, echt Sindet immer größere Amerfennung und eignet sich gleich vortressstilch zum Treiben wie für's freie Land. Chprischer früher Englischer mittelsrüher Englischer mittelsrüher Erfurter, großer früher bester. | 6 R6 9 R6 0 R6 1 Sgr 4 . 7 15 | 3 4 5 5 9 5 5 22 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| "früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwerts. Haricot nain de Hongrie. Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemtich hoch, die Hilfen sin böchstend 2 30ll lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechdonne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind zesocht ungemein zart. Kanr genug empfoblen werden. Hundert sir Gine früse gelch unders, neu. gelbe Zuckers. große seine weiße Zuckers oder Butters sein weißen Buckers. genge feine weiße Buckers ganz klein. Sehr reichtragende Bohne durfte sich zum Anb | weiße 5 12 forte. b nur 3 nu aften fide anubere rein 1 nicht 4 5 5 au im | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, 100 Pfd. Schwarze, 100 Pfd. 100 P | 6 Rc 9 Rc 0 Rc 10 | 3 4 5 5 9 5 5 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| "früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwerts. Haricot nain de Hongrie. Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemtich hoch, die Hilfen sin böchstend 2 30ll lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechdonne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind zesocht ungemein zart. Kanr genug empfoblen werden. Hundert sir Gine früse gelch unders, neu. gelbe Zuckers. große seine weiße Zuckers oder Butters sein weißen Buckers. genge feine weiße Buckers ganz klein. Sehr reichtragende Bohne durfte sich zum Anb | weiße 5 12 forte. b nur 3 nu aften fide anubere rein 1 nicht 4 5 5 au im | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, 100 Pfd. Schwarze, 100 Pfd. 100 P | 6 Rc 9 Rc 0 Rc 10 | 3 4 5 5 9 5 5 22 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstaudige, extra lange breite is Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemtich hoch, die Hilfen sin böchtens 2 30ll lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechdobne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind zefocht ungemein zart. Kanr genug empfoblen werden. Hundert sitr Eine frisheste Sucker- oder Butker- gelbe Zucker- große seine weiße Zucker- oder Butter- sehr reichtragende Bohne dürfte sich zum And Brochen eignen. Klageolet-, friihe rothe | weiße 5 12 forte. b nur 3 nu aft en fide anubere rein 1 nicht 4 5 5 au im 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Rc 9 Rc 0 Rc 10 | 3 4 5 5 9 5 5 22 120 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwerts. Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Sie Studen sind ziemlich boch, die Hösissen sind ziemlich boch, die Historien ind diemlich boch, die Historien der Goden, ihrer Aleinbeit wegen wie feine zum Einmachen, die trochnen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesoch ungemein zart. Kanr genug empsohlen werden. Hundert silr Sine risiheste Sechswochens, neu. gelbe Zuckers große seine weiße Zuckers oder Butters sehr reichtragende Bohne dufte sich zum And Brlageolets, friihe rothe Wilmot's gelbe friihe Zwergs Eine belgelbe nierenförmine Bohne, welche welche met belgelbe nierenförmine Bohne, welche melden | weiße 12 orte. 30 att 30 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 | 3 4 5 5 9 5 5 9 5 22 120 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert- "Haricot nain de Hongrie. Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hilfen sin böcktend 2 30ll lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechdobne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind zefocht ungemein zart. Kanr genug empfoblen werden. "Hindert filr Eine früheste Sechswochen-, neu. "gelbe Zucker- "große seine weiße Zucker- oder Butker- "gene beuter- "gene beine Bucker- "große seine weiße Bucker- oder Butker- "sehr reichtragende Bohne bürste sich zum Und Kroßen eignen. "Klageolet-, frühe rothe "Wilniot's gelbe frühe Zwerg- Eine bellgelbe nierenförmige Bohne, welche m sehr reich ist; sie trägt ungenein reich, so das bie | weiße 5 12 forte. b nur 3 au aft en fid anthere rein 1 nicht 4 5 5 au im 5 5 au im 4 5 5 sirflich © Etau- | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 | 3 4 5 5 9 5 5 9 5 22 120 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwerts. Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Sie Studen sind ziemlich boch, die Hösissen sind ziemlich boch, die Historien ind diemlich boch, die Historien der Goden, ihrer Aleinbeit wegen wie feine zum Einmachen, die trochnen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesoch ungemein zart. Kanr genug empsohlen werden. Hundert silr Sine risiheste Sechswochens, neu. gelbe Zuckers große seine weiße Zuckers oder Butters sehr reichtragende Bohne dufte sich zum And Brlageolets, friihe rothe Wilmot's gelbe friihe Zwergs Eine belgelbe nierenförmine Bohne, welche welche met belgelbe nierenförmine Bohne, welche melden | weiße 12 forte. b nur au aften fich andere rein- i nicht 4 8 5 au im 4 5 sirtlich forten | . 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 | 3 4 5 5 9 5 5 9 5 22 120 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert- "Haricot nain de Hongrie. Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich boch, die Hisselfen bie Schoten, ish ziemlich boch, die Hisselfen die Schoten, ish trer Rieinbeit wegen wie feine zum Einmachen, die trochen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanzgenug embsobsen werden. Hundert sir Eine frisheste Sechswochen-, neu. gesbe Zucker- große seine weiße Zucker- oder Butter- seine weiße Zucker- Pers-, ganz siein. Sehr reichtragende Bohne dürfte sich zum And Gebr reichtragende Bohne dürfte sich zum And Gebr reichtragende Bohne durfte sich zum And Gebr reichtragende Sich er sich eine selb, in das die ben, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnens zulammengefest erscheinen. Es ist eine sehr gute nicht die beste Zeibbohne; in England ift es b | weiße 5 12 50rte. 12 50rte. 12 30rte. 16 b nur 3u aften fich ambere rein- 1 nicht 4 5 5 au im 4 4 5 6 . | . 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 | 3 4 8 sgr 5 9 5 22 120 75 10 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwerts. "Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Sie Studen sind ziemlich doch die Historien ind diemlich doch die Historien der His | weiße 12 .orte. 30 alt en fich anubere rein- 1 nicht 4 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 | 3 4 5 5 9 5 5 9 5 22 120 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- "Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hilfen sin böchtens 2 301 lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechdohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werden. "Hundert sitr Gine "frilheste Sechswochens, neu. "gelbe Zuckers. "große feine weiße Zuckers oder Buttersteine weißen gunders. "große feine weiße Buckers, ganz klein Eebr reichtragende Bohne bürfte sich zum Anb Greßen eignen. "Klageolet-, friihe rothe "Wilmiot's gelbe friiße Zwergs—Gine bellgelbe nierensörnige Bohne, welche miehr früh ist; sie trägt ungemein reich, so daß die den, wenn das Laub abzefallen, nur aus Bohnen jusammengeset erschene. Es ist eine selfz gute, nicht die beste Treibbohne; in England ist es bischerte zu diesen Jwecke. ***Rafferländer, sehr ergiebig und grün | weiße 5 12 5orte. 12 5orte. 12 5orte. 12 sorten fich aurbere reina nicht 8 5 5 au im 4 4 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, 100 Kfd. Schwarze, 100 Kfd. Blumenfohl, Afiatischer großer später. Berliner früher, echt Tinder weißere Unerfennung und eignet sich gleich vortressschaften wie für's freie Land. Chprischer früher Tenglischer mittelsrüher Tenglischer früher Seien bester. "" guter nachgebauter. "" guter nachgebauter. "" guter nachgebauter. "" guter nachgebauter. "" in holland gezogener. "" und holland | 6 Re 9 Re 0 Re 1 Sgr 4 | 3 4 8 sgr 5 9 5 22 120 75 10 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- "Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hilfen sin böcktens 2 30l lang und sehr törnerreich. Nicht sift diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werben. "Hundert sir Gine "früheste Sechswochens, neu. "gelbe Juckers. "große seine weiße Zuckers oder Butters" seine weiße Zuckers. "große seine weiße Zuckers oder Butters" seine weiße Zuckers. "Filageolets, frühe rothe "Bilmot's gelbe frishe Zwergs. Eine hellgelbe nierenförmige Bodne, welche m sehr früh ift; sie trägt ungemein reich, so daß die ben, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnen, yusammengelest erschenen. Es ist eine sehr gute, nicht die beste Treibbohne; in England ist es bischen zu diesen Zwecke. Rafferländert, sehr ergiebig und grün sie getrocknet zum Koden ausgezeichnet | weiße 5 12 forte. b nur 3 u aft en fich aurbere reina nicht 4 5 5 au im 4 5 fortlich & tau- ichtoten wenn die ge- fowohl 4 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Til 1 Sm 1 S | 3 4 4 5 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemtich boch, die Hilfen sin böchtenst 2 30tl lang und sehr körnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, bie trochnen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind zeschetn, ihrer Rieinbeit wegen mie keine zum Einmachen, die trochnen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanzgenug embfoblen werden. Hundert sir Eine früheste Sucker- verlagenug embfoblen werden- gesbe Zucker- große seine weiße Zucker- oder Butter- seine weiße Bucker- Perl-, ganz siein weiße Bucker- sehr reichtragende Bohne dürfte sich zum And Gregen eignen. Klageoset-, frühe rothe Bilmot's gelbe frühe Zwerg- Eine belgelbe nierensörnige Bohne, welche w sehr früh sit; sie trägt ungenein reich, so daß die den, wenn daß Laub abgefallen, nur auß Bohnen zusammengefest erscheinen. Es ist eine sehr gute nicht die bette Terebbohne; in England the est dichsteste zu biesem zwecke. Rafferländer, sehr erziebig und grün wie getrocknet zum Rochen außgezeichnet Weitploes, neue amerikanische | weiße 5 12 forte. b nur 3u aften fich anubere rein- 1 nicht 4 5 au im 5 au im 4 5 weiße ge- fowohl 4 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 4 500 55 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwert- "Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hilfen sin böcktens 2 30l lang und sehr törnerreich. Nicht sift diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werben. "Hundert sir Gine "früheste Sechswochens, neu. "gelbe Juckers. "große seine weiße Zuckers oder Butters" seine weiße Zuckers. "große seine weiße Zuckers oder Butters" seine weiße Zuckers. "Filageolets, frühe rothe "Bilmot's gelbe frishe Zwergs. Eine hellgelbe nierenförmige Bodne, welche m sehr früh ift; sie trägt ungemein reich, so daß die ben, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnen, yusammengelest erschenen. Es ist eine sehr gute, nicht die beste Treibbohne; in England ist es bischen zu diesen Zwecke. Rafferländert, sehr ergiebig und grün sie getrocknet zum Koden ausgezeichnet | weiße 5 12 forte. b nur 3u aften fich anubere rein- 1 nicht 4 5 au im 5 au im 4 5 weiße ge- fowohl 4 5 | | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 Re 9 Til 1 Sm 1 S | 3 4 4 5 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 |
| früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet "hochstandige, extra lange breite i Schlachtschwerts. "Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich boch, die Histelie Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Eine Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur wickengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empschlen werden. "Hundert sitr Sine "frische Sechswochens, neu. "gelbe Juckers. "große seine weiße Zuckers oder Butters seine weiße Zuckers, Berls, ganz klein Eeft reichtragende Bohnen bürfte sich zum Anb Vreißen eignen. Blageolets, frühe rothe "Bilmot's gelbe friihe Zwergs Eine belgelte nierenförmige Bohne, welche wiehr krüb ist; sie trägt ungemein reich, so das die den, wenn das Laud abgefallen, nur aus Bohnen zusammengefest erschenen. Es ist eine sehr gute, nicht die beste Treibbohne; in England ist es hichterste zu diesem Zwecke. Rasserländer, sehr ergiebig und grün wie getrodnet zum Rochen ausgezeichnet "Frijoles, neue amerikanische. "gelbschalige Wachss, "nit schwarzen Bedochtaubig. | weiße 5 12 5orte. 12 5orte. 12 3orte. 12 3orte. 12 3orte. 12 5orte. 12 5 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 4 500 55 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich hoch, die Hilfen sin böcktens 2 301 lang und sehr törnerreich. Nicht sift diese Bohne eine gute Brechdohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werden. Hundert sitr Eine früheste Sechswochens, neu. gelbe Juckers. große feine weiße Zuckers oder Butters seine weiße Buckers, perls, ganz klein Sech reichtragende Bohne bürfte sich zum Anb Großen eignen. Flageolets, frühe rothe Bilntot's gelbe frithe Zwergs Eine bellgelbe nierenförmige Bohne, welche m sehn wend bas Laub abgefallen, nur aus Bohnen zu gummengefest erschenen. Es ite eine sehr gute, nicht die beste Treibbohne; in England ist es dichstete zu diesen Jwecke. Rafferländer, sehr ergiebig und grün wie getrocknet zum Rochen ausgezeichnet Frijoles, neue amerikauische gelbe Nierens | weiße 4 weiße 5 12 forte. 12 forten fich anubere reinanicht 13 14 15 15 15 16 16 16 10 10 10 10 10 10 10 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 4 500 55 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich boch, die Hispalien sin böchtenst 2 30tl lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug emtschlen werden. Hundert sir Eine früheste wegen mie keine genug emtschlen werden-, neu. gesbe Zucker- große seine weiße Zucker- oder Butter- seine weiße Zucker- Berl-, ganz stein eth reichtragende Bohne dürfte sich zum And Großen eignen. Klageoset-, frühe rothe Bilntot's gelbe frühe Zwerg- Eine belgelbe nierensörmize Bohne, welche w sehr reichtragende Bohne dürfte sich zum And Großen eignen. Klageoset-, frühe rothe Bilntot's gelbe frühe Zwerg- Eine belgelbe nierensörmize Bohne, welche w sehr reichtragende Schle sitt eine sehr gute, mich die beite Terebbohne; in England ist es b schauben zu beschallen, nur aus Bohnen zu aummengefest erscheinen. Es ist eine sehr gute, mich die beite Terebbohne; in England ist es b schauben zu beschallen, nur aus Bohnen zu aummengefest erschebohne; in England ist es b schafterte zu biesem zweck. Rafferländer, sehr ergiebig und grün wie getrochnet zum Rochen ausgezeichnet Frijoles, neue amerikauische. gelbschliche Strauchsaltat-, aus Ranado | weiße 5 12 forte. b nur 3u aften fide ambere rein- 1 nicht 48 5 5 au im 4 45 fortole ge- fowohl 4 5 ohnen 10 4 4 6 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 4 5 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| früheste holländische weiße Schwerts, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwerts. Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich boch, die Hilfen sin böchstenst 2 301 lang und febr törnerreich. Richt ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur wickengroßen, weißen Bohnen sind gekocht ungemein zart. Kanr genug empfohlen werden. Hundert silr Sine früheste Sechswochens, neu. gelbe Zuckers große feine weiße Zuckers oder Butters seine weiße Zuckers, Berls, ganz klein Sehr reichtragende Bohne dürfte sich zum Anb Wreßen eignen. Klageolets, frühe rothe Bilmot's gelbe frühe Zwergs Eine bellgelbe nierenförmige Bohne, welche wiehr früh ist; sie trägt ungemein reich, so daß die den, wenn das Laub abgefallen, nur aus Bohnen zusammengefest erschenen. Es ist eine sehr gette, nicht die beste Treibbohne, in England ist es bischstefte zu desem L. Kasserte zu desem Zwecke. Kassertländer, sehr ergiebig und grün wie getrocknet zum Kochen ausgezeichnet Frijoles, neue amerikaussche gelbe Nierens weiße Nierens, sehr ergiebig. " vöthliche Strauchjalats, aus Kanada Recht bochstaudige, sehr ergiebig. | weiße 5 12 forte. b nur 3u aften fide ambere rein- 1 nicht 48 5 5 au im 4 45 fortole ge- fowohl 4 5 ohnen 10 4 4 6 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 4 5 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| früheste holländische weiße Schwert-, Treiben besonders gern angewendet hochstandige, extra lange breite is Schlachtschwert- Haricot nain de Hongrie Eine unendlich reichtragende neue Die Stauden sind ziemlich boch, die Hispalien sin böchtenst 2 30tl lang und sehr törnerreich. Nicht ist diese Bohne eine gute Brechbohne, sonst eine zum Einmachen, die trocknen, nur widengroßen, weißen Bohnen sind gesocht ungemein zart. Kanr genug emtschlen werden. Hundert sir Eine früheste wegen mie keine genug emtschlen werden-, neu. gesbe Zucker- große seine weiße Zucker- oder Butter- seine weiße Zucker- Berl-, ganz stein eth reichtragende Bohne dürfte sich zum And Großen eignen. Klageoset-, frühe rothe Bilntot's gelbe frühe Zwerg- Eine belgelbe nierensörmize Bohne, welche w sehr reichtragende Bohne dürfte sich zum And Großen eignen. Klageoset-, frühe rothe Bilntot's gelbe frühe Zwerg- Eine belgelbe nierensörmize Bohne, welche w sehr reichtragende Schle sitt eine sehr gute, mich die beite Terebbohne; in England ist es b schauben zu beschallen, nur aus Bohnen zu aummengefest erscheinen. Es ist eine sehr gute, mich die beite Terebbohne; in England ist es b schauben zu beschallen, nur aus Bohnen zu aummengefest erschebohne; in England ist es b schafterte zu biesem zweck. Rafferländer, sehr ergiebig und grün wie getrochnet zum Rochen ausgezeichnet Frijoles, neue amerikauische. gelbschliche Strauchsaltat-, aus Ranado | weiße 5 12 forte. b nur 3u aften fide ambere rein- 1 nicht 48 5 5 au im 4 45 fortole ge- fowohl 4 5 ohnen 10 4 4 6 | 6 | Gewöhnliche weiße (uach dem Marktpreis) 100 Hellers, | 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % | 3 4 5 5 9 5 5 22 120 75 10 | 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| | - | | 4 | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| 3 | Pfund | Con | | | |)funi | | Coth Sgr T | 1 9 |
| Blumentohl. " Italienischer, größter Derselbe ensprach, wenigstens auf unserem Berjudsfelbe, nicht ben ihm gewordenen Em- |)l. Sgr. | 5gt 55 | | Winters bis zum Berbrauch im Freien er liefert aber, in einem luftigen Kellei ichlagen, größere Ausbeute von Sprosse lettere sich bier noch weiter ausbilden. Das Ausschneiben ber herzrasse (boch Das Ausschneiben ber herzrasse | n, weil | | | | |
| Broccoli (Spargelfohl), Elletson's Raiser= | 2 . 1 20 | 3 2 | 6 | Blätterfohl (Grünfohl) hoher franser | grüner | 1 | 25 5 | | 6 |
| "Kaiserlicher großer Witter | 1 25 2 . | 2 | | niedriger frauser griner niedriger frauser griner feingefrauster Edinbur Die niedrigen Sorten sind mehr zu en | ger . | | 20 25 | 1 | 6 |
| Bon außerordentlicher Sestigkeit und auf hie- figen Märtten fast ausschitestich angeboten. Braunichter, großer platter, extra | 2 20 | | 6 | Die niedrigen Sollen find und besonder weil sie sich unter dem Schnee besonder halten. Blätterkohl, bunter Plimages oder fohl, verschiedene | Feder= | | 15 15 | 3 5 | 6 |
| " allerfrühster Joanet, oder Nantais, niedriger weißer sester Ensield Market, früher, vorzüglich. | . 25 | 5 1 | 6 | Palmens Peibe in Töpfe zu set beforativ. Schriftschl (Frühlings-) branner. | | | 12 | 1 1 | • |
| Frsurter großer sester, extra Filder, echter spiger weißer, wird bestonders für hohe Lagen empsohlen Griechischer Centners Holländischer, platter | 3 1 3 1 1 1 1 1 | 5 4 | £ 6 | griiner mit Blumentohlolatt. gesber (Butterfohl) Gin sehr beachtenswerther Kohl, werten ausbält und bessen große gelbe Hein zartes, im Geschmad ben Wirslingktressends Gemilde geben. | elder int erzblätter obl über- | | 16 25 | 1 | 6 |
| "Cin Zwergkohl ersten Ranges, ber Kopf etwas pis. Der früheste Kopftohl von allen uns be- | | 4 | 1 . | Futterfohl, hoher blauer Niese. | ilk ibm | 1 1 1 | 15 15 | 2 2 1 | 6 |
| ter gesact werden, da die frunen Hungen gunty in demielben Sahre noch durchgeben. König der Kopffohle, ein niedriger hitter, sehr garter Weißfohl. Neu. | 2 | | 3 2 | " Engl. Kuhfohl (JerseyKale). " ausdauernder v. Doubenten . " großer, Tausendföpfiger " Meer- oder Seckohl (Crambe ma | | 1 1 1 | 10 | 1 1 2 | 6 |
| Migdeburger großer platter Rürnberger weißer großer später Schweinfurter früher großer, echter Strasburger gr. Ctr.s., spät, sehr gut Ulmer großer Centuer Winner großer Centuer | 1 1 1 6 3 2 1 | 5 | 2 7 4 4 3 | Liefert eins ber feinlten Gemuge, mit einer Zeit, wo der Mangel barun am si sit. Man saet ben Samen im Marz bie Pflangen in fruchtbaren Boben mit sein hoerbst wie Spargelbeete mit fur ger. Bom zweiten, besser vom britter fürzt man im Spätberbst über die Töpse (over Kaiten) und umgiebt bie | ihlbarften , verseht 10 bedeckt 3em Dün- Sahr ab Pflanzen elben mit ätter und | | | | |
| " Portscher frisher spiker niedriger " Zuckerhut früher " blutrother großer später rundföpfiger. " " schwarzrother früher rundföpfiger | | | 2 3 3 | Gressen, zu bleichen. | de. | | 10.0 | | |
| rother kleiner von Utrecht | 2 | 1 | 3 | Wiener, furzlaubige friihe weiße G blane Die feinsten Sorten, aber von viel Paner als die folgenden. Inm Treib | las= | 2 2 | 15 15 | | |
| Gine prate, neu empfohlene Narietät, welche bei zeitiger Aussaat eine ungewöhnliche Größe und Festigkeit erlangen soll. Wirfingtohl (Savoyer), Blumenthaler, gr. gelber | 1 | 10 | 2 | fie gern genommen. Frühe weiße feine engl. Glas blaue " " Mittelfrühe weiße blaue blaue blaue | | 1 | 15 10 | 64 64 | |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 2 2 | | 3 | Saaher Miesen-Kohlrabi, bla | ne | 46 | 25 15 | | 1 |
| ihn zu weiteren Anbauversuchen einstehlen. de Vertus, sehr groß, extra Drumhead, engl. großer später | | 20 | 2 1 3 | "Erreichen ein gang bebeutentes G bleiben babei noch gart. Gehr gu en | ipledien. | | | | |
| Marcellin, niedr. früher, vorzüglich neuer goldgelber Rürnberger, früher Kapuciner Ulmer, früher grüner | 1 2 | 10 15 | 3 2 3 | Rohlrüben oder Steckri (Kohlrüben in der Erde, Ruta Wruden genannt.) | baga, and | | | | |
| " Ulmer, großer später, gut Bictoria, neuer frauser englischer Wiener, gang niedriger Treibs Buders, früher gelber | 2 1 1 2 | 10 15 20 | 3 2 2 3 | In Holge ber wieberholten Mahrnel von Nielen die Kohlrüben zu frih gei und bann zuweilen in den Same machen wir darauf aufmerksam, daß am besten erst Mitte Upril geschieh | n schießen, die Aussaat | | | | 1 |
| Richt (Briffel. Sproffen.) hol, gewöhnt. niedriger Defer Kobl, von welchem befanntlich bie röschen artigen Sproffen in den Battwinkeln ein außerft feines Gemuße liefern, fann gwar während bes | 1 | 25 10 | 1 2 | Gelbe glatte gewöhnliche, 100 Pft 100 Beiße " 100 " | 28 ZH. 28 " | | 10 10 11 11 11 11 | 0 | 1 1 1 |

| 6 | " lange rothe Braunschweiger, " halblange Franksinter. " rothe von Surren, lange schöne Rübe " rothe Hornsche, sehr früh, lang. " lange violette nene. Futter-Möhren. Große weiße grünk. Riesen. — Saat, 100 Ffd. 15 Thl. " " " abgeriebene Saat, — 100 Ffd. 19 Thl. " orangegelbe (rothe) grünk. Riesen. — 100 Bfd. 28 Thl. " orangegelbe (rothe) grünk. Riesen. — 100 Bfd. 28 Thl. " gelbe Saalselder (Darßer) 100 Ffd. 22 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Vogesische. " gelbe " Burzeln. " Haftinak, große runde verbesserte. " von Fersen, große Eine verbesserte Varietät, welche auf der Inselenten verbesserte Varietät, welche auf der Inselenten verbesserte Varietät, welche auf der Inselenten verbesserten, we die Kultur der Vassinate auf einer hohen Stute seht, gesüchtet ist. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. " Beterssitien, lange glatte " kurze dicke süße " Rapontica (Oenothera biennis) " Kappunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner- oder Schwarzwurzel " Sellerie-, Ersurter großer bester Knoll- " bolländischer großer bester Knoll- " bolländischer großer knoll- " bolländischer großer knoll- | | 100 100 110 111 115 66 7 100 8 8 166 12 16 25 5 6 6 7 7 7 100 15 25 | 1 1 1 1 1 |
|----|--|--|---|--|
| 11 | nalblange Frankfurter. nothe von Surrey, lange schöne Mübe nothe Hornscheft, sehr früh, lang. nothe Weiße grünk. Riesen, siesige Saat, 100 Kfd. 15 Thl. nothe Hornscheft, sehr frühk. nothe Hornscheft, seigensche Grünk. nothe Hornscheft, seigensche Hornscheft, seigenscheft, seigensche Hornscheft, seigensche Hornscheft, seigensche Hornscheft, grüße nothe Hornscheft, größe runde verbesserte. nothe Freier Garietät, welche auf der Iniel Sersen, wo die Kuttur der Kaftinafe auf einer hohen Stufe sieht, gesüchtet ist. nothent, eine lange glatte Rübe bildent, sehr ertragreich heterscheften, lange glatte nothent, sehr ertragreich heterscheften, lange glatte nothentscheften, lange glatte nothentscheften | | 10 12 11 15 6 7 10 8 16 12 16 25 5 6 | 1 |
| 6 | rothe Hornick, lange schöne Kibe rothe Hornick, sehr früh, lang lange violette nene. Futter-Möhren. Große weiße grünk. Riesen., Hiesige Saat, 100 Kfd. 15 Thl. madgeriebene Saat, 100 Kfd. 19 Thl. vorangegelbe (rothe) grünk. Riesen. 100 Kfd. 28 Thl. gelbe Saalselder (Darßer) 100 Kfd. 22 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Vogesische. magele. parente blanche. halblange weiße Vogesische. gelbe " Burzeln. haser= paftinals, große runde verbesserte. poul Fersey, große. Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insellente bildent, seine lange glatte Rübe bildent, seine lange glatte Rübe bildent, seine lange glatte Rübe bildent, sehr ertragreich. Beterssien, lange glatte. Rapontica (Oenothera biennis) Rapunzel (Campanula Rapunculus) Scotzoner- oder Schwarzwurzel. Selleries, Ersurter großer bester Knolls. | | 12 11 15 6 7 10 8 16 12 16 25 5 6 | 1 |
| 6 | " lange violette nene. " lange violette nene. " lange violette nene. " lange violette nene. " " " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 15 Thl. " " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 19 Thl. " orangegelbe (rothe) grünk. Richens, 100 Pfd. 28 Thl. gelbe Saalselber (Darßer) 100 Pfd. 22 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Bogesische. " gelbe " gelbe " " Burzeln. " Hastinafs, große runde verbesserte. " von Fersey, große. " inne verbesserte Larietät, welche auf der Insel Bersey, wo die Kultur der Britinafe auf einer hohen Stute sehrt, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. " Betersisien, lange glatte. " Rapontica (Oenothera biennis). " Rapungel (Campanula Rapunculus) " Scorzoners oder Schwarzwurzel. " Selleries, Ersurter großer bester Knolls. | | 11 15 6 7 10 8 16 12 16 25 5 6 7 7 7 10 15 | 1 |
| 6 | Futter-Wöhren. Große weiße grünk. Riesen-, Hiesige Saat, 100 Ph. 15 Th. " " " abgeriebene Saat, | | 6 7 10 8 16 12 16 25 5 6 7 7 7 10 15 | 1 1 1 |
| 6 | Große weiße grünk. Niesen=, Hiesige Saat, 100 Ffd. 15 Thl. " " abgeriebene Saat, 100 Ffd. 19 Thl. " orangegelbe (rothe) grünk. Riesen- 100 Pfd. 28 Thl. gelbe Saalselder (Darßer) 100 Pfd. 22 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Vogesische. " gelbe " Burzeln. " Haftinal=, große runde verbesserte. " von Fersen, große runde verbesserte. " von Fersen, große runde auf der Insele Sersen, wo die Kultur der Arstinate auf einer hohen Stute seht, sezüchtet ist. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. " Beterssien, lange glatte. " Aapontica (Oenothera biennis). " Rapninzel (Campanula Rapunculus) Scorzoner- oder Schwarzwurzel. Sellerie-, Ersurter großer bester Knoll- | | 7 10 8 16 12 16 25 5 6 7 7 7 10 15 | 1 1 1 |
| 6 | Große weiße grünk. Niesen=, Hiesige Saat, 100 Ffd. 15 Thl. " " abgeriebene Saat, 100 Ffd. 19 Thl. " orangegelbe (rothe) grünk. Riesen- 100 Pfd. 28 Thl. gelbe Saalselder (Darßer) 100 Pfd. 22 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Vogesische. " gelbe " Burzeln. " Haftinal=, große runde verbesserte. " von Fersen, große runde verbesserte. " von Fersen, große runde auf der Insele Sersen, wo die Kultur der Arstinate auf einer hohen Stute seht, sezüchtet ist. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. " Beterssien, lange glatte. " Aapontica (Oenothera biennis). " Rapninzel (Campanula Rapunculus) Scorzoner- oder Schwarzwurzel. Sellerie-, Ersurter großer bester Knoll- | | 7 10 8 16 12 16 25 5 6 7 7 7 10 15 | 1 1 1 |
| 6 | Saat, 100 Pfd. 15 Tfl. " " " abgeriebene Saat, 100 Pfd. 19 Tfl. " orangegelbe (rothe) grünf. Riesen-, 100 Pfd. 28 Tfl. gelbe Saalselder (Darßer) 100 Pfd. 22 Tfl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanehe halblange weiße Vogesische " gelbe " Burzeln. " daser= " Pastinas, große runde verbesserte. " von Fersen, große runde verbesserte. " bon Fersen, große runde verbesserte. " bon Fersen, große runde verbesserte. " bon Fersen, große runde verbesserte. " beine verbesserte Karietät, welche auf der Insel Sersen, wo die Kuttur der Kristinate auf einer hohen Stuse siehen, seine lange glatte Rübe bildent-, eine lange glatte Rübe bildent, sehr ertragreich " Beterssien, lange glatte. " suze dick siße " Rapontica (Oenothera biennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus) Scorzoner- oder Schwarzwurzel " Sellerie-, Ersurter großer bester Knoll- | | 7 10 8 16 12 16 25 5 6 7 7 7 10 15 | 1 1 1 |
| 6 | 100 Pfd. 19 Thl. " orangegelbe (rothe) grünt. Riesen- 100 Pfd. 28 Thl. gelbe Saalselder (Darker) 100 Pfd. 28 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte trans- parente blanche. halblange weiße Vogesische " gelbe " Wurzeln. " hasers. " von Fersen, große runde verbesserte. " von Fersen, große Eine verbesserte Varietät, welche auf der Inseldenen Stufe stehen, wo die Kultur der Vastinate auf einer hoben Stufe steht, gesüchtet is. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. " Betersitien, lange glatte " kapontica (Oenothera biennis). " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner- oder Schwarzwurzel. " Sellerie-, Ersurter großer bester Knoll- | | 10 8 16 12 16 25 5 6 77 7 7 10 15 | 1 1 |
| 6 | " orangegelbe (rothe) grünk. Riesens, 100 Pfd. 28 Ffl. gelbe Saalscider (Darker) 100 Pfd. 28 Ffl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Vogesische " gelbe " gelbe " Burzeln. " Hastinaks, große runde verbesserte. " Pastinaks, große runde verbesserte. " von Fersen, große. Eine verbesserte Karietät, welche auf der Insel dersen, wo die Kultur der Kastinake auf einer hohen Stufe steht, gezüchtet ist. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. " Beterssien, lange glatte. " kuze dicke süße " Rapontica (Oenothera viennis). " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoners oder Schwarzwurzel. " Selleries, Ersurter großer bester Knolls. | | 10 8 16 12 16 25 5 6 77 7 7 10 15 | 1 1 |
| 6 | gelbe Saalselber (Darker) 100 Psb. 28 Thl. weiße durchsichtige frühe, Carotte transparente blanche. halblange weiße Vogesische "gelbe " Wurzeln. "Hastinate, große runde verbesserte. "Hastinate, große runde verbesserte. "Von Fersen, große. "ine verbesserte Karietät, welche auf der Inseldenen Stufe steht, gezüchtet ist. "Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich. "Beterssien, lange glatte. "Kapontica (Oenothera viennis). "Rapunzel (Campanula Rapunculus) "Scorzoner- oder Schwarzwurzel. "Selleries, Ersurter großer bester Knolle. | | 8 16 12 16 25 5 6 7 7 7 7 7 10 15 | 1 1 |
| 6 | parente blanche halblange weiße Vogesische yelbe yelbe yelbe yelbe you Faftinafs, große runde verbesserte. y Pastinafs, große runde verbesserte. y von Fersen, große Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insele Versen, wo die Kultur der Vasstinafe auf einer hohen Stute steht, gezüchtet zit. y Student-, eine lange glatte Kübe bildend, sehr ertragreich ybeterssien, lange glatte y surze dicke siße Rapontica (Oenothera diennis) y Kapunzel (Campanula Rapunculus) Scorzoners oder Schwarzwurzel Selleries, Ersurter großer bester Knolls | | 16 12 16 25 5 6 7½ 7 7 10 15 | 1 1 |
| 6 | pateinte blanens halblange weiße Vogesische " gelbe " Wurzeln. " Haftinafs, große runde verbesserte. " Hastinafs, große runde verbesserte. " von Fersen, große. Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insel Jersen, wo die Kultur der Vastinafe auf einer hohen Stute stedt, gezüchtet zit. " Student-, eine lange glatte Kübe bildend, sehr ertragreich. " Betersitien, lange glatte. " furze dicke süße. " Raponica (Oenothera biennis). " Kapungel (Campanula Rapunculus) " Scorzoners oder Schwarzwurzel. " Selleries, Ersurter großer bester Knolls | | 12 16 25 5 6 7½7 7 10 15 | 1 1 |
| 6 | " gelbe " Wurzeln. " Hasers. " Hastinats, große runde verbesserte " Pastinats, große runde verbesserte " von Fersen, große. Eine verbesserte Karietät, welche auf der Ansel Sersen, wo die Kultur der Kastinate auf einer doben Stufe steht, gezüchtet ist. " Student-, eine lange glatte Kibe bisdend, sehr ertragreich " Betersitien, lange glatte " Luze dicke siße " Kapontica (Oenothera biennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus). " Scorzoners oder Schwarzwurzel " Selleries, Ersurter großer bester Knosse. | | 16 25 5 6 7½ 7 7 10 15 | 1 |
| 6 | 2Burzeln. " Haftinaf-, große runde verbesserte " Bastinaf-, große runde verbesserte " von Fersen, große. Eine verbesserte Natietat, welche auf der Insel Sersen, wo die Kuttur der Kritinase auf einer hohen Stufe siedt, gezüchtet zus. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich " Betersisien, lange glatte " kuze dicke siße " Rapontica (Oenothera viennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner- oder Schwarzwurzel " Sellerie-, Ersurter großer bester Knosse | | 25 5 6 7½ 7 7 10 15 | 1 |
| 6 | " Haftinat-, große runde verbesserte. " Poul Fersey, große " von Fersey, große Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insel Fersey, wo die Kultur der Vasstinate auf einer hohen Stute stedt, gezüchtet zit. " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich " Betersitien, lange glatte " furze dicke siße " Rapontica (Oenothera biennis) " Kapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner- oder Schwarzwurzel " Sellerie-, Ersurter großer bester Knoll- | | 5 6 7½ 7 7 10 15 | 1 |
| 6 | " boll zersey, große Eine verbesserte Varietät, welche auf der Insel Gersey, wo die Kultur der Vasstinate auf einer hohen Stute stedt, gegüchtet zit. " Student-, eine lange glatte Riibe bildend, sehr ertragreich " Betersissen, lange glatte " furze dicke siiße " Rapontica (Oenothera biennis). " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner- oder Schwarzwurzel " Sellerie-, Ersurter großer bester Knoss- | | 7½ 7 7 10 15 | 1 6 |
| 6 | hosen Student-, eine lange glatte Riibe bildend, sehr ertragreich " Student-, eine lange glatte Riibe bildend, sehr ertragreich " Betersitien, lange glatte " Luze dicke siße " Rapontica (Oenothera biennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner» ober Schwarzwurzel " Sellerie», Ersurter großer bester Knoss. | | 7½ 7 7 10 15 | 1 6 |
| | hosen Student-, eine lange glatte Riibe bildend, sehr ertragreich " Student-, eine lange glatte Riibe bildend, sehr ertragreich " Betersitien, lange glatte " Luze dicke siße " Rapontica (Oenothera biennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner» ober Schwarzwurzel " Sellerie», Ersurter großer bester Knoss. | | 7 10 15 | 1 6 |
| | " Student-, eine lange glatte Rübe bildend, sehr ertragreich " Betersitien, lange glatte " furze dicke siße " Rapontica (Oeenothera biennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoners ober Schwarzwurzel " Selleries, Ersurter großer bester Knolls | | 7 10 15 | 1 6 |
| | bildend, sehr ertragreich " Betersisien, lange glatte " surze dicke sisse " Rapontica (Oenothera biennis) " Rapunzel (Campanula Rapunculus) " Scorzoner- oder Schwarzwurzel " Sellerie-, Ersurter großer bester Knoss- | | 7 10 15 | 1 6 |
| | napontica (Oenothera biennis) Rapungel (Campanula Rapunculus) Scorzoner- ober Schwarzwurzel Selleries, Erfurter großer bester Knolls | | 7 10 15 | 1 6 |
| | "Rapontica (Oenothera biennis) "Rapungel (Campanula Rapunculus) "Scorzoner, oder Schwarzwurzel "Selleries, Erfurter großer bester Knoss | | 10 15 | 6 |
| | " Sellerie=, Erfurter großer bester Knoll= | | | |
| | " Sellerie=, Erfurter großer bester Knoss- | 1 | 20 | |
| | n hollandischer großer Quall | 1 | 20 | 2 |
| | Blaich andick | 1 | 5 | 2 |
| 6 | " Bleich= englischer " Cole's Kristall | | 10 | 2 2 |
| | " Zuner= feine | 1 | | 1 |
| | Rüben, Mai= frühe runde weiße Soll. | . / | 9 | 1 |
| | " gelbe, feine Nübe " gelbe Finn= " | | 9 | 1 |
| | landische, neue schöne Ribe | 1 | | 1 (|
| | " " feine gelbe Malteser | 1 | | 1 |
| 6 | " " toutiopige jehr fruhe Ameri- tanische, seine schöne Rübe | | | |
| 0 | mit gelbem ungemein zartem | | | |
| | Fleische | 10. | 12 | 1 . |
| | " Serbit= lange meiße | | | 1 . |
| | " " gelbe Bortfelder | 1 | | 1 . |
| | " " fl. weiße echte Teltower | 1 | | 1 . |
| | " " jour greneuje | | | $\frac{1}{1} \frac{6}{6}$ |
| | " " Boule d'or, sehr zart | | | 1 . |
| | Ruben, Salat= (Beete), schwarzrothe | | 9 | 1 . |
| 1 | n n n tunde Zuners | 1 | 12 | 1 . |
| 1 | Bem, rothgeaderten Kleisch . | 1 | 12 | 1 . |
| | " " " ichwarzrothe Castelnandry 1 | | 5 | 1. |
| 1 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | | | |
| 1 | ver= oder weigrippine. — Scharlach= | | | |
| 1 | rippige. Jede Sorte à Lth. 1 Sgr. | | | |
| 1 | others. All Mullipell mile tout nur die mein- | | | 1 |
| | | " Schneeballs, weiße frühe " Herbste lange weiße " " gelbe Bortselber " " h. weiße echte Teltower " " von Freneuse " " soule d'or, sehr zart Nüben, Salats (Beete), schwarzrothe " " " von Bassano, mit weis sem, rothgeaderten Fleisch " " " " on Bassiensis goldsrippige. — Scharlachsrippige. — Scharlachsrippige. Sebe Sorte a Lth. 1 Sgr. | " Schneeball-, weiße frühe " Hange weiße " gelbe Bortselber " fl. weiße echte Teltower " bon Freneuse. " ich weiße echte Teltower " bon Freneuse. " ich weiße echte Teltower " bon Freneuse. " ich warzsche Leifat " Boule d'or, sehr zart " Boule d'or, sehr zart " neute Guargrothe " neute Juder | "Fcrost- lange weiße frühe 12 "Ferdst- lange weiße 10 " gelbe Bortselber 15 " gelbe Bortselber 25 " gelbe Bortselber 25 " gelbe Bortselber 25 " gelbe Bortselber 25 " gelbe Bortselber 20 Müben, Salat- (Beete), schwarzrothe 9 " " runde Zucker 12 " " " pon Bassano, mit wei- gen, rothgeaderten Fleisch " " schwarzrothe Castelnandry " Mangold (Beta brasiliensis) gold- rippige. — Carmossurippige. — Scharlach- rippige. Fede Sorte & Lth. 1 Sgr. Tie Blattrivpen liesen ein äußerst seines Semise. In Krantreich wird fast nur die weiß- rippige Bar. benust. (Poirée à cardes blanches.) |

| | | | | 6 | , - | | 100 1 | 160. | V funi | d |
|---|--------|-------|-------------|-----|-----|--|----------|--|---------------|--|
| 1 | ofun | | Fotl Soc | | | 1, 175 | Th | | Sgr. 3 | Chg. |
| 1- | - | 20 | 1 | - | 0 | berdorfer gelbe, echt (Bayer. Rangeres) | 20 16 | | 7 6 | 6 |
| Rerbelriibe, Chaerophyllum bulbosum Erop vielseitiger Empfehlungen hat diese un. | | | | 1 | Qe. | hier nachgebante | | | 15 | 4 |
| gemein wohlichmedente State Rerbreitung ge- | | | | 1 | | Bon Leutewit Direct bezogen. | 24 | | 9 | |
| funden. Gie gebeigt in feben nor bem Binter ac- | | | | | Ji | Eine allgemein zu ben besten aller runben Formen gegantte Sorte. | | | | |
| faet werben. Da nut gung fil det | | | | | (3) | latha Witomer Seller | 17 17 | | 6 | |
| Prompt erledigen. Kerbelrübe, sibirische, Chaerophyllum | 0 | | | | R | lothe Wiener Teller | 1. | 1 | | |
| Prescotti barum porgezogen | 3 | | 4 | 1 | - | b) halblange L ormen. Belbe Riesen=Klaschen= | 13 | 10 | 5 | |
| in werden, well fie noch gettig im Orthykay | 1 | | | | 00 | 3-16 Biston Silvichell | 13 | | 5 | 6 |
| faet werden fann. | | | | | 0. | dout's Nicfen-Angale | 20 15 | | 6 | |
| Rüben zum Anban im Großen | | | | | 3 | c) lange Formen. | W | O Lot | 100 | 100 |
| auf bem Felde: | | | | | a | Batha aus der Erde machsende) Gionen fich | 13 | | 5 | 4 |
| Englische Futterrüben, engl. Feld-Inrnips. White globe, weiße Augel-, | | | | | 10 | a con Cousa machienne am pellell | 13 13 | 15 | 5 5 | |
| 100 30. 20 291. | | 9 | 1 | 1 | 2 | Weiße aus der Erde wachsende (3um Blatten Beige aus der Erde wachsende (3um Blatten Lanze rothe halb aus der Erde wachsende. | 13 | | 5 | |
| Woolton's hybrid red globe. Wools tou's hybride rothe Rugels, vorzügliche | | | | m | 1 | | W IS D | 16 | | |
| Canto (10) DID. 24 201. | | 8 | 1 | | | Zucker- Nunkeln. | 7 | 10 | 3 | |
| Skirving's improved purple-top, Sfirving's verbesserte Bullock, 100 Pf. 29 Thl. | | 10 | 1 | | | Echte weiße (zur Zuckerfabrikation) Echte weiße Imperials " | . 7 | | 3 9 | |
| Gehr haltbar. | | | | | 1 5 | Echte weiße Imperials " | . 25 | | 11 3 | |
| Green-top yellow Bullock, grüntöpfige gelbe Bullock, 100 Pfd. 29 Thl. | | 10 | 1 | 1. | 1 | 6 03 mms | Di | fund Sgr | | oth E Th |
| Purple-top yellow Bullock, violettöpfige gelbe Bullock, 100 Pfd. 29 Thl. | VI. | 10 | | 1 . | | Zwiebeln und Porree. | | 17 | | |
| Dalo'a bybrid griinfopfige gelbe Dale's | 107 | h., | | | 1 | Zwiebeln, blagrothe Erfurter dunkelrothe Braunschweiger (blintroth | e | 0) | | 1 6 |
| hybride Augels, 100 Bfd. 30 Thl. White Pomeranian Globe, weiße Poms | | 11 | | 1 | | " nouanorly | 1 . | 22 | | |
| morithe 81100 = 1100 DD. 20 211. | | 9 | | 1 | | gelbe plattrunde holländische | | 2 | 5 1 | $\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ |
| White Green-top Tankard, weiße grünt. Rrug*, 100 Pfd. 26 Thi. | | 9 | | 1 | .1 | Madeira aroute rilloe Illejen | | 1 20 | | 2 6 |
| Vollow Tankard, geibe Krug=, 100 , 20 , | | 3 | | 1 | | " platte Riesen= Greichen eine bebeutenbe Größe, sind ab | er | 100 | 1 | |
| White Red-top Tankard, weiße rothf. Rrug= 100 Ffb. 25 Thi. | | 1 | 9 | 1 | | wenig haltbar. Man unf fie ins Miftbeet fa und auspflanzen, da sie eine langere Begetation | 8= | | | |
| Musita Norfolk meine Norfolter | 10 | | 9 | 1 | | Beit beaufpruchen. | | $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ | | 1 6 |
| mwooddale improved, gelbe violetföpfige, | | | | | | " schwefelgelbe holländische, beste " silberweiße | | 1 | 5 | 2 . |
| 100 \$10. 30 27. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cat Chames | | 1 1 | 5 | 2 1 |
| White-Green-top Globe, weiße grüntöpf. Rugel, 100 Pib. 20 Thi. | | . 7 | 1/2 | 1 | | "Winter-Heckes Seite 8. | | | | |
| White Autumn Stubble 100 , 26 , Waite's Eclipse Purple-top yellow, | | - | 9 | 1 | | Manuag grapter Variability | | | 7½ | 1 |
| | | . 1 | 0 | | | französischer dider Sommer= dider Winter= | 0" 0 1 | | 20. | 1 |
| Nene, von England aus als vorzüglich an- gepriesene Sybride. Sie zeigte fich bei und als | 3 | | | | | " von Rouen oder monströser fur dicker, sehr großer | ger | 1 | 5 | 2 |
| gelofteischige icone und gitte bet nortreffich und mit | 0 | and a | | | | von Poitou, großer gelber | | 1 | 5 | 2 |
| ihr nachgeruhnt, bag bat bette Borgen merde | | 10/10 | | | | salat. | | | | |
| Herbstrüben, lange weiße rothf. Ader oder Stoppel-, 100 Pib. 18 Th | = | | 8 | 1 | | (m. haboutet meifier, s ichwarzer Samen.) | | | 2 | . 1 |
| oder Stoppets, 100 ph. 10 29 | r | | 1 | | | Cauffalat Steinkonfe, früher gelber W | - 4 | i | 20 | 1 |
| Stoppels, 100 pp. 24 29 | = | | 9 | 1 | | " Reibe mu Treiben. | D | | 17 | |
| " lange weiße grund." (Nürub.), 100 Pfd. 24 Th | ſ. | | 9 | 1 | 1. | Offictischer, großer gelber W | | | 25 25 | 1 |
| | | | | | | " Chrius, großer gelber W | | | 25 | 1 |
| Runkelrüben. | | | | | | Marzualich teit und patibut. | 31 | 17 | 25 | 1 |
| | | | | | | Forellen=, bunter w | | п. | 25 | 1 |
| Gewicht p. Mge. ca. 2 Pfd. | 110 | 00 pf | D. | Pfn | | Olambian and College W | | 1 | 15 | 1 |
| a) runde Lormen. | 1 | pt s | dr. | | Phy | In der Eigenschaft, jelbit in ben geigeten | önfe | 30 | 03 | 1 |
| | . 1 | 2 1 | | 5 | | trodensten Jahren icone und glebe, patte and gibe, patte angeres jens von keiner anderen erreicht. | | 1770 | 1,53 | 1 |
| Gelbe Klumpers | . 1 | | - 11 | - | | | | | | 1 |

| 40-40 | 11 | Ofnud | £ | oth- | T. | | | | |
|---|-----|--|------|------|---|------|--------------|---------|-----------|
| Salat. | 33 | L Sgr | Sge | Phy | - Outitie. | 27 | Ifund Sgr | | ith Na |
| " größter Schtweizer, sehr gut w " hochgelber Gier- w | 1 | 1 . | 1 | | " allerfrühste Treib= 25 Korn 2 Sgr. | | | 25 | - |
| " Bruine geel, frühester w | 1 | $\frac{25}{25}$ | 1 1 | 6 | " weike Schlangen= | 6 | | 7 | 6 |
| " Non plus ultra | 17 | 120 | 10 | | " früheste ruffische echte, gum Gin- | - | | 1 | 10 |
| Gin gang vorzüglicher Galat mit febr großen festen Röpfen und recht bauerhaft. | 1 | | - | | Diese frube und ungewöhnlich volltragende | 1 | | 1 | 0 |
| " Bringenkopf=, gelber w | | 25 | 1 | 6 | | | | 1 | İ |
| " blaggelber Dresdener, zu empfehlen w | 10 | 25 | 1 | | mit ausgezeichnetem Erfolg, und zwar unter Boden- und Witterungsverhaltniffen, unter benen andere Sorten nur mangelhafte Refultate lie- | | 10 | | - |
| " aus Algier, Treib= | | 1 10 | 2 2 | | T CLICIT. | | | | |
| " Schwedenkopf=, röthlicher | 1 | $\begin{vmatrix} 10 \\ 25 \end{vmatrix}$ | 1 | 6 | Gurken, immertragende (semperfructi- fera), echt. 25 Korn 2 Sgr. | | | 0.5 | |
| " Parifer Zucker-, sehr groß u. gart | | | 1 | 6 | " furze triihe Trauben= | 1 | 5 | 25 2 | • |
| " Wontree, jehr früher w | | 25 | 1 | 6 | " lange grüne Patrix (bis 25 Roll lang) | - | 0 | ~ | - |
| " beste Sorten gemischt. Binter-, branner | | 25 | 1 | 6 | 25 Korn 2 Sar | | win | 25 | |
| Schnitt= ober Stechfalat, frauser gelber. | 1 | 25 15 | 1 1 | 6 | " blaßgrüne brafilianische zum Treiben 25 Korn 2 Sgr. | | | 95 | |
| Aderialat, Rabinschen, am Rhein Maus- | 1 | 10 | 1 | - | " Arnstadter Riefen=, grüne, gusge= | | | 25 | ٠ |
| ohren gen., (Valerianella olitoria) | | 15 | 1 | | zeichnet. 25 Korn 24 Sar | | 7. | 35 | |
| " Hollandischer, großer | | 20 | 1 | 6 | " grune Chinesische Schlangen : Beibe gehoren zu ben portrefficiten Gruten | 8 | | 10 | |
| " Stalienischer, ertra Diese Sorten muffen stets im Geptbr. gefaet | 1 | 5 | 2 | | Beibe gehören ju ben vortrefflichten. Gurten, jowoll fur's Mittbeet mie fur's freie Land. Gie | | | 7 | |
| inethen. | _ | | | | rungseinfluffe und befallen nicht leicht. | | | | |
| Endivien, große weiße Batavier | 1 1 | | 1 | 6 | " Gladiator, zum Treiben 25. April 2 Sor. | | | 25 | |
| " neue moosartige, feinste | 1 | 15 | 2 | 6 | " allergrößte Treib-, non plus ultra 25 Korn 2 Sgr. | | | 20 | |
| , jelbitichließende Coffeler Sommer- | 1 | 5 | 2 | | " Roman emperor, Treibe, porzijalich | 8 | | 20 | ٠ |
| Die Endivien bieten eine angenehme And- bilfe, wenn ber Winter bem Gebrauch ber | .0 | | | ш | " Sion House, schone Treib = Gurfe | | | 10 | |
| bille, wenn der Winter eine augenehme And- bille, wenn der Winter dem Gebrauch der Kopffalate ein Elel sest. Man binde die flach auf der Erbe liegenden Blätter nach erlangter Anöbildung an einem trodenen Tage mit Basit Jusammen, wodurch die inneren bleich und art werden. Bei eintretenden Kroft werden bei | | 5-1 | | 1 | - 25 Rorn 25 Sar | | | 30 | |
| Ansbildung an einem trodenen Tage mit Baft | | 911) | | | Melonen, Mai= — Ananas=, vorzliglich — große Nets= (eine der ertragreichsten) — | | | | |
| | | | | 3 | Chito aus Havanna - Friihe Mets- | | | | |
| folgen ober aufgehöngt. | | | 1 | 2 | Waller- oder Angurien- Cantaline — | .] | | | |
| Kresse, grüne gewöhnliche | | 5 | | 6 | Pariser Glocen =, für's freie Land, — Zucker= von Tours — Muskat= — Pres= | non) | | | |
| " extra frause (Plümage) | | 6 | | 6 | cott-Cantalupe aus Bervianan — Rene | | | | |
| majus). | | 15 | 1 | | Amerikanische für's freie Land - non | | 10 | 416 | |
| " neue grime amerikanische | 1 | | | 6 | Honfleur - White Japan - von Cypern | | 10 10 | Jak. | |
| ~ | | 264 | | 1 | - Sfellmann's feine Nets - weiße bon Dolo. | 4 | | a style | |
| Spinat-Sorten. | | | -7 | | Bon vorftebend. Melonenforten die Bort, 24 9/45 | | | | |
| Spinat, rundblättriger, 100 Bfb. 9 Thi. | | 4 | 1000 | 6 | 1 Sortiment von 12 Sorten 224 Sor. | 11/1 | | | |
| Gleich nugbar ale Winter-G., wie für ben Commeranbau. | | | | | Melonen in fehr guten Gorten melirt | | | 12 (|) |
| Sommeranbau. " gelber salatblättriger | in. | 6 | | 6 | Kürbis. | N | 1 | | |
| " Lee's neuerter Ritelent fou 6-8 Rus | | | 91 | | PT T common to the last | 540 | | 1 | |
| hoch werden. Driginal-Portion 15 Sgr. | | 4 - | | | a. Speise-Kürbis. | | 20 | | |
| " Neusecländer (Tetragonia expansa) Dieser sehr wohlichmedende, die allgemeinste | | 15 | 1 | | Engl. Schmeer= (Vegetable marrow) Großer Feld= | | 20 15 | 2 6 | |
| heißen Jahredzeit ma der gemähnliche & faum | | | | | Großer weißer Centner= | | | 0: | |
| gur Entwicklung gelangt, eine willfommene Unshilfe. Die borber eingeweichten Rerne | 177 | 11 | | | " rother " | | | 8 . | |
| iverveit duf nahrhaftein Booen in 1 BB. Ent- | M | | 4 | | " gelber " von Balparaiso | П | | 8 . | |
| fernung gestedt und feucht gehalten. Man ichneidet gewöhnlich nur die Blatter, die fich | 10 | 1116 | 1146 | | " Melonen-, Centner, echter, Port, 4 San | | | 0 : | |
| immerfort erganzen. | 9 | | , 1 | 2 | Reapolitanijajer oder Porte – Manteau | - | - | | |
| . ausdauernder (Phytolacca esculenta) Die rothen Beeren werden vielfach zum Far- | 3 | | 4 . | | (Mantelsach) Portion 2 Sgr | 1 | . 1 | 2 1 | |
| ben von Bingligtetten 2c. benutt. | 3 | 15 | 1 | П | ichmades allen andern Sorten vorzuziehen. | | | | |
| " englischer perenn. (Rumex Patientia) Sebrempfehlenswerth als angenehmes Gemufe. | 16 | 15 | 1 . | 1 | b. Zier-Kürbis. | 1 | | | |
| " Vernanner (Chenopodium Quinoa) | | | 1 . | | Rachftebende Gorten baben meift aubergrandentlich | | | 1 | |
| Sauerampfer, großblättr. Garten= Gistraut (Mesembryanthemum crystalli- | | 15 | 1 . | П | gierende Früchte. Die mit & bezeichneten eignen ich befonders gur Befleidung bon Lauben ac. | 1 | | | |
| num) | | | 3 . | | 9. SColoquinte, apfelform. | 1 | | 1 | |
| | | de | 110 | | 3. , fleiner echter 11. Colinder., goldgelber | | | 115 | |
| Gurfen und Melonen. | | 19.1 | 110 | | 5. § Birns, zweifarbiger 13. Flafchens | | | 1 | |
| | 2 | | 3 . | | 6. , fleinster gruner 14. Reulenförmiger aller- | | | 7 | |
| | 4 | | 5. | 1 | 7. Bijchofeniube, bunte 15. § Rugels, weißer | | | 18 | |
| a gome enjamigette | - | | 1 . | | 8. Chinefermuge,] . 16. § " hochrother | 1 | | 1 | |

| 8 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-----------------|------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Pland Dl Sgr | Coth Spc Pfg | | | | | | | | | |
| 17. Straußei, weißes 20. Walbhornförmiger 18. Türkenbund, rotherge- 21. Zwiebel-, kleiner dunftreifter 21. Stackelbeer-, aller- kleinster kleinfter | ThL | ogr | Spr. S | 2/15 | Senf, gelber | . 20 1 20 1 25 | . 6 1 6 2 . 2 6 | | | | | |
| Jede Sorte à Br. 2 Sgr. Rleinfrüchtige Sorten gemischt à Br. 1 Sgr. Großfrüchtige Sorten gemischt à Br. 1 Sgr. Die anderen Zierkürbisse siehe "Cucurditaceen" Seite 9. | | • | 5 4 | | Mernuth Erdnunkeln (Cyperus esculentus), Kuollen Erdnuß, Erdeichel (Arachys hypogaea) Champignonsbrut Anleitung zur vertheilbaften Erziehung von Shaunpignons wird auf Wunsch beigefügt. | 1 10 . 20 . 15 . 14 | 2 . 1 . 1 | | | | | |
| Küchenkräuter 20. | | 6 | | 6 | and Ct. damiehelm e | to | | | | | | |
| Anis Artischocken, große grüne | | • | 3 | 6 | Pflanzen, Steckzwiebeln e | | | | | | | |
| Bafilitum, großer grüner | 1 | 10 | 2 | | Steckzwiebeln. | 100 €t. | Dd. Sgc | | | | | |
| feiner frauser | 1 2 | 10 | 3 | | Gewöhnliche | 1000 " | 1 10 5 1 10 | | | | | |
| Bohnen- oder Pfefferkrant, Kölle Borretich | | 12 12 20 | 1 1 1 | 6 | Da diese Zwiedel über Winter im Freien au so bildet sie vom Frühling bis zur Ausbildung beren Sorten eine wichtige Aushülfe. Schalotten, gewöhnliche bänische bäniche | sbauert, ber an= | 7 | | | | | |
| ben wie Spargel ober Salat zubereitet. | | 5 | | 6 | Berlzwiebeln. Rersendhar n Juli bis Augus | it. | 12.5 | | | | | |
| Dill. Eierfrucht, Solanum melongena, weiße und piolette | | 7 | 4 | 6 | Rodambolzwiebeln | 1000 , | 1 20 5 | | | | | |
| Mesembrianthemum crystallinum Esdragon (Artemisia Dracunculus) Pslanzen | | i | 3 | | Bartoffelzwiebeln, geibe beste Beine und fehr gu em | pfehlen. | Ds. St. | | | | | |
| 12 St. 18 Sgr. a St. 2 Sgr. Giebt bier keinen keimfähigen Samen. | | 12½ | 1 | | Ausdauernde Küchengewächs | c. | Dis. St. Sgr. Sgr. | | | | | |
| Fenchel, süßer Bologneser | | 6 | 1 | 6 | Artijchocken, überwinterte Pflanzen | | 71/2 1 | | | | | |
| Jop Kerbel, franser | 11 . | 16 | 1 | 6 | Sjop (Hysopus officinalis). | | 6 1 6 1 | | | | | |
| Lavendel oder Spike | 1 | 16 25 | 1 1 | | Meerfohl (Crambe maritima), ftarte Bflangen | | 10 1% | | | | | |
| Liebesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum Majoran, franz. Standen- | 1 | 224 | 1 1 | 6 | Galbei (Salvia officinalis) | | 7½ 1 15 2 | | | | | |
| Meliffe, Citronen= | 1 | | 2 | 6 | Thymian (Thymus vulgaris) | | 7½ 1 15 2 6 1 | | | | | |
| Beterfilien-Burzel, lange glatte | | 7 | 100.0 | 6 | Tripmadam (Sedum reflexum) Raute (Ruta graveolens) Mhabarber (itate Alanzen) Spargel, bester Niesen, | 15 Ggr. | 2 | | | | | |
| " extra franse Pflück | | 6 | | 6 | | | | | | | | |
| " niedrige ertra krause Zwerg= " Myatt's zierende | | 7½ 12 | 1 1 | | Frühjahrspflanzen von Ge | im Srübi | l. | | | | | |
| Bfeffer, span., Capsicum annuum |] | | 2 | | Unfere Brobefelber feben und in ben Stand, Bflanggeit von faft allen Gemujen Pflangen gu ben abgeben gu fonnen, und bitten wir nur um rechtze | mäßigfte itige Beft | n Preisen ellung. | | | | | |
| Pimpinelle | | 25 | | 6 | | | Mehr | | | | | |
| " griiner Porree, größter Brabanter | | 15 25 | 1 1 | | Aartoffeln. | = 1 | Sgr. Di | | | | | |
| " frangösischer, dider Commer | | $\begin{vmatrix} 177 \\ 20 \end{vmatrix}$ | | | Kürstenwalder, frühe rothe | ftebe | 4 . | | | | | |
| , " von Ronen oder mouftrofer | ľ | 1 5 | 2 | | Mürstenwalder, friihe rothe | Sreife Sifpel Beffel onber | G 4 . | | | | | |
| furzer dicker, sehr großer von Poiton, großer gelber | . | 1. 5 | 2 | | | 2002 | ₹ 4 . . 4 . | | | | | |
| Rhabarber, Bictoria- Die in Englaub jo bäufige Verwendung be gebleichten Blattfitiele biefer Bilause zu Com pots u. f. w. jollte auch bei und mehr beachte | r | 1 . | 1 | 6 | Sediswodien. lange weiße Befannt als die jrufeste unter allen Kartoff | eIn. | 6 | | | | | |
| Naute oder Weinraute | | 15 | 1 2 | | Madistartoffel Dieje Corte wurde von dem Gartenbauverei | | | | | | | |
| Rosmarin, französischer | | 20 | 1 | | Breuß. Staaten empfohlen. Sie gegort gu | ben femi | ten, | | | | | |
| Sauerampfer großblättriger | | 1 20 |) 2 | 8 6 | | | 6 | | | | | |
| " holländischer großer Knoll= | | $ \begin{array}{c c} $ | | | St. B. W. W. B. | | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | | | | | |
| Cole's Pristall= | . 12 | 1 10 |) 5 | 2 . | Biscuit= ", " | | 6 | | | | | |
| Senf, brauner hollandischer | • 1) • | | 11 . | | Constitute Obselventiallan | | | | | | | |

à 100

à 100

a à 100

Aftern . 10

12

12 13

20

Levkohen.

Ein Sortim. Engl. Sommer-Levkop, in 13 Farb. à 100 Korn 174 , " Reie großblum. Sommer-

| | 10 goth Br. | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--------------|--|--|----------|--|--|--|--|
| No. | | 1- | Sgr | | Sgr | Sgr | | | | |
| 15 | Ein | Sortiment Neue Zwerg-Byra in 8Farben à 100 Korn miben-Sommer-Levkoyen . in 8Farben à 100 Korn 3 Cngl. Sommer-Levkoyen mit | 15 | Acacia pulchella, niedlich verticillata, quirlförm Sammtlich schon, in | e A | 1½ 2½ | | | | |
| 16 | 7 | Lackblatt | 10 | pon gelb blühend. Acanthus mollis, echte a Aconitum excellentissim | | 1% | | | | |
| 18 | - 79 | Reute großblumige Byrami- neue großblumige Byrami- beut-Sommer-Levkoben . , 10 , à 100 , | 12½ | orientale | | 1 | | | | |
| 19 20 | , | Reue Bouquet Commier-Lev. , 4 , à 100 , Frühblübenbe engl. herbste 2. , 6 , à 100 , 5 erbste der Bastard-Levkohen , 8 , à 100 , à 100 , | 10 15 | uncinatum, buntelvit | nienrothes Acrocl. OTF 5 | 1 1 1 | | | | |
| 21 22 23 | 7 7 | Cocarben -, ober Stangen - | 12½ | roseum fl. albo, weißt 1 Fuß hohe, schone | Immortellen. | 2 | | | | |
| 24 | , | Großblum. Kaifer-Levkohen . " 8 " à 100 " | 15 | mit zahlreichen, rojaf | arbenen Bluthen | 2 | | | | |
| | | Goldlad. & TF. | 7 | 82 vernalis, gruolinges | ET 1-14 guß, himmelblau 5 | 1 1 2 | | | | |
| 25 26 | Ei | n Sortiment gefüllter Stangen Lad in 3 Farb. à 100 Korn , Busch-Lad , 5 , à 100 , | 10 | 84 nanum, niedrig . | 8 | 2 | | | | |
| | | Balfaminen. | 6 | 86 Agrostemma coen ros 1\5 Ff. h. Leb 87 , fl. albo, weißi | a, himmelörööchen. * FT. baft roja | 1 | | | | |
| 27 28 29 | | in Sortim. ertra gefüllt. Balfaminen in 8 Farb. à 25 Korn (Samellien-Balfaminen , 6 , à 25 , | 7½ 8 8 | | riata mit lebhaft rofafarben | 3 3 3 | | | | |
| 30 | (5 | Olitaria and Coffiliar | 75 | 91 " purpurea, purpur | roth | 3 | | | | |
| 32 | | in Sortim. Vittersport, gelütter hoher. FT in 8 Farb. à 1/4 Ltb | 7½ 10 | pacten Buchs ans. 92 coeli rosa hybr. fl. | pl. In iconen Farben, bis litblichenbe Pflanzen liefernb, | | | | | |
| 33 34 35 | | n gerulter hydritthechter. " 8 " à 1/s " " refüllter levkoyenblith. " 8 " à 1/s " " Trichterwinden (Ipomoea 6 à 1 Pr. | 16 | openaria Sammel | nelfe. F. 2-3 Ff. carmin- | 5 | | | | |
| 36 | | n purpurea) OF , 6 , à 1 Br. Wohlriechende Wickett (Lathyrus odoratus) OF , 7 , à 1 , | 5 | dos Jovis, Inviters | blume. 4 F. Hochrofa 3 | 1 2 | | | | |
| 37 | 7 | " " Bunderblumen (Miraottis 10 , à 1 , | 75 | 95 Allium azureum, himn 96 Alonsoa grandiflora, g | nelblauer Lauch. 4 F. 2 Ff | 1 13 | | | | |
| 3 | 8 | " " Flammenblumen (Phiox 8 à 1 " | 15 75 | 98 Alstroemeria chilens | is, Bekannte Brachtpfl. 4 TF. gefülte Malve ober Stodtofe | 2 | | | | |
| 4: | U | Frühlter Krorr-Mohn (Fr. , 10 , à 1 , Gefüllter Päonien-Wohn , 10 , à 1 , defülltes Krenstraut (Senecio elegans fl. pl.) (FT. , 5 , à 1 , | 78 | in has Manatane | is, Berannie prindirig gefülte Malve ober Stockrofe anumelt von unferem vorzüg- glischer Preismalven, welches jamulung bes Gartenbauver- jamulung bes Gartenbauver- | | | | | |
| 4 | 2 | " Helichrysum monstrosum 5 à 1 , | 7 5 | eins allgemeine | Bewunderung erregte. Davon irte Portion 1 Thir. 10 Sgr. | 2 | | | | |
| | 3 4 | Portulac OFT. "5 " à 1 " " gesülter Portulac, Portulat. " 3 4 " 450 Kort | 73 | 101 Alyssum Benthamii, *(| Fr. 1—14 Th. h. weiß, duftens | 1 2 | | | | |
| | 5 | Primula chinensis of T , 6 , at 1 &r Tropaeolum nanum (Tom Thumb var.) DOTF , 5 , at 1 , | 75 | Wierzbeckii, gold | meifarhig * TF. 14 88. b. | 5 1 | | | | |
| | 7 | ", Zinnia elegans OTF. ", 4 ", à 1 ", | 10 | 105 " caudatus, (FT. | eschmänzter | 1 | | | | |
| . ! | 19 50 51 | " Sommerblument für's freie | 20 | OTF. | breifarbig, Bavageienfeber. Mit | 5 1 6 1 | | | | |
| | 52 | Commerblumen für's freie | 15 | prachtiger Belau | innosetrum robustum) Tettau's | | | | | |
| | 53 | " Commerblumen für's freie | 30 | 109 Ammobium alatum, | carnea ffeifchfarb. 24 O T.F. 1 | 6 1 | | | | |
| | 54 | Sommerblumen für's freie gand . 100 , à 1 , Sommerbl. jur Ginfaijung , 12 Farb. à 1 , | 60 | | | | | | | |
| | 55 56 | , Sommerbl. zur Enfunfung, 12 " à 1 " , Rant- und Enfunghlanzen " 12 " à 1 " , Schönblibende und becorative | 15 | | errothe. Neu und prächtig ugenie. Neu, hellblau und lila | . 14 | | | | |
| | 57 | Topfgewächse für's Warm | 30 | to the fillings | , Lilien-Baunblume. 24 F. 2 86., nften Perennien . s, großes Löwenmaul. & F.T. | - 1 | | | | |
| | 59 | Toufaetuächse für's Kalthaus , 12 , à 1 , | 2. oth 1 | Antirrhinum maju Prächtige N | nancen gemischt. Cortiment Thumb, leuchtend, fucheroth. | 5 | | | | |
| | | mation | Sgr S | Swerglotti | ang niedrige Art ju Ginfaffun- | | | | | |
| | 60 | Abobra viridiftora & TF. Coone Cucurbitacee mit glangend gruner Belaubung und icarlactothen Früchten | | striatum, gestreif | te Barietaten, gemischt | | | | | |
| | 61 | Abronia umbellata, policentintinge automic | 10 | 4 F. | un fa | 8 | | | | |
| | 62 63 | Acacia albicans, weighting attages of a argyrophylla, filberblättr. A. | | 122 , fl. purpureo pl. Skinneri. Sch | irlachroth mit gelb, eine ber | . 1 | | | | |
| | 64 | cordata, reichblinhend und jedt gietrich | 5 | 124 , vulgaris fl. pl., | Mildung Impulter garren | 4 | | | | |
| | 66 67 68 | " longitona, tangblatting of | 4 | 126 Arctotis breviscapa | furgicaftiges Barohr. * TF. | - 1 | | | | |
| | 69 | Eine der beliedielten Immert imgen | 5 | 127 , sulphurea, jo | nwefelgelbes B | 1 | | | | |

| No | | Loth Sgr | Pr. Sgr | - Mar | | Loth Sgr. | Pr. |
|------------|--|-------------|------------|-------|---|--------------|-----|
| 128 | Argemone platyceras grandiflora, großblum. Stachel- | 6 | 1 | | 3. apfelblutben 8. buntelcarmoifin | | -0- |
| 129 130 | mobn. 40 TF. 2 Fb. h., weißblühend | 6 | 1 | | 4. roja mit weiß 9. violet 5. duntelroja mit weiß 10. duntelviolet 6. carmoijin 11. duntelviolau | | |
| 131 | *24 F. Ganz niedrig | 6 | 1 | | 7. carmoisin mit weiß 12. violetbraun mit weiß 13. dunkelblau mit weiß | | |
| | Alitern. | _ | 10 | 142 | Jede farbe à 1000 Korn 5 Gar à Rrife 1 Gar | 7½ | 1 |
| | Jedes Sahr bringt uns neue Formen, neue Ru- | | 1 | 143 | 2 | 1/2 | |
| | ancen, die Buchter wetteifern mit einander in Bervollkommnung biefer herbftforblumen und tein Garten, fein Gartchen fann biefen Schund | | 41 | | Die Pflange wird nur & Sug boch und tft mit ihren | | |
| 4 | mehr entbehren. | | No. | | icon geformten, zierlichen Blumen forochl im Lande wie in Löpfen außerordentlich ansprechend. | | |
| 132 | Päonienblüthige Phramiden-After. | - 1 | C. | | 1. rein weiß 7. kuhferbraun 2. weiß mit carmin 8. dunkelroth mit weiß 3. pfirfichblithen 9. hellblau | | |
| | (Truffaut's Perfection.) Sebr gefüllt und schon geformt mit großen | 57 | | | 4. dunfelroja 10. dunfellila 5. hellcarmin 11. violet mit weiß | | |
| | Blumen, Blumenblatter einwarts gebogen, pracht- voller Ban und herrliche Farben. 1. weiß (rund gebaut) 8. hellblau mit weiß | | 0.5 | | 6. carmoifin mit weiß 12. dunkelblau Bebe garbe à 500 Korn 4 Sgr., à Brife 1 Sgr. | | |
| | 1. weiß (rund gebant) 8. helbsau mit weiß 2. rein weiß (lodig) 9. purpurviolet mit weiß 3. weiß mit carminr. Herz 10. weiß mit schwarzblau | | | 144 | Diefelben gemischt 1000 Rorn 6 Ggr | 12 | 1 |
| - 1 | 4. la superbe (prächtig ro- 11. apfelblüthen fenroth, extra großbl.) 12. lebhaft rosa | | 1 | 145 | Zwerg-Bouquet-Pyramiden-After. | | |
| | 5. carmoifin 13. fenrig carmoifin 6. victoriaroth (lenchtend 14. violetroth | | | | Im wahren Sinne bes Wortes Blumenppramiben en miniature bilbend. 1. rein weiß 6. carmin mit weiß | | |
| | 7. bunkelcarmoifin 15. rothbraun mit weiß 16. schwarzbl. m. Atlahal. | | 10 | | 2. fleischfarben 7. hellblau 3. pfirsichblathen 8. lajurblau mit weiß | | |
| 133 | Jede Farbe à 500 Korn 6 Sgr., à Prije 11/2 Sgr. Dieselben gemtscht 1000 Korn 8 Sgr. | 20 | 1½ | | 4. rojenroth 9. violet 5. carmoifin 10. dunfelblau | | |
| 134 | Chrhsanthemumblüthige großblu- | -01 | 8 | 146 | Jebe Farbe à 500 Korn 6 Sgr., à Brise 114 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr | 30 | 1 |
| | mige Zwerg-Aster. | | _ | 147 | 11hlands-Alster. | | |
| Σ, | Eine ber empfehlenswertheften Formen, bie bei iconer Barbung und tabellofem Bau ber Blumen | era l | -1 | 17 | Gine ber icagbarften neueren Buchtungen. Die febr großen Blumen find benen ber Baonienafter | | |
| | ich burch niedrigen Sabitus, reiches und frubzeiti- ges Bluben auszeichnet. | | | | ähnlich; die Pflanzen verzweigen fich ftark. 1. schneeweiß 6. carmin mit weiß | 71 | |
| | Dadurch, daß die Blumen in gleicher höhe ftehen, eignet sich diese Aster wie keine andere zur Bespflanzung von Arabesken. | 23 | | | 2. rosa u. weiß 7. hellblan mit weiß 3. carmolsin 8. brillant lisa. | | |
| (- | 1. rosa 7. weiß mit hellblau 2. hellblau 8. rein weiß, im Ber- | 100 | 72 | 1 | 4. hellblau 9. dunkelcarmoifin, nen 5. lebhaft rosa mit weiß 10. carmin, neu | | |
| | 3. buntelblau bliben lafurblau 4. carmin 9. rein meiß | 3 | | 147a | umflort Tebe Farbe à 500 Korn 6 Sgr., à Prise 11/2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr. | 30 | 1 |
| | 5. bunkelblau mit weiß 10. fleischfarben 6. bunkelrosa mit weiß 11. carmin mit weiß | | | | | 00 | |
| 135 | Jebe Farbe & 500 Korn 6 Sgr., & Brife 14 Sgr. Diefelben gemifcht 1000 Korn 8 Sgr | 0 | 1 | 148 | Truffant's Imbrique-Pompon- | | |
| 136 | Cocarden=Zwerg-Chrhsanthemum= | | | 2 | Alter. Gine reigenbe reichblubenbe Corte, mit zierlichen, bicht- | | |
| 1 | Alster. | | | 1 | gefüllten kugelförmigen Blumen. 1. rein weiß 6. violet mit weiß | | |
| 0 | arminroth. Gine couftante, fcone, lebhafte Cocarben- After unter ben fo febr und mit Recht beliebten 3merg- | | | ž | 2. weiß mit bunfelblau 7. braunviolet mit weiß 3. rosa 8. bunfelroseuroth mit weiß | | |
| - | Chryfanthemuni-Aftern 100 Rorn 6 Ggr., 25 Korn 2 Ggr. | | 20 | | 4. carmin 5. carmin mit weiß 6. carmin mit weiß 7. carmofin, neu 7. carmofin, neu | | |
| 137 | Zwerg-Bouquet-After. (Bolge) | | | 149 | Jede Farbe à 500 Korn 6 Sgr. à Prife 11/2 Sgr. | 30 | ų. |
| | Sehr conftant im Sabitus und außerft zierlich. 1. weiß mit rothem Berg 4. bunfelviolet mit weiß | 0 | | 150 | | 00 | |
| | 2. dunke!carmin mit weiß 5. weiß mit dunkelblau 3. carmin mit weiß 6. carmin | | | 100 | Aronen-, Aranz- oder Cocarden- | | |
| 120 | Jebe Farbe & 500 Korn 5 Sgr., & Prife 14 Sgr. | 90 | | | Dit briftanter Zeichnung. | ш | |
| 138 | Dieselben gemischt 1000 Korn 7 Ggr 21 | 0 | 15 | | 1. carmoifin 4. roja 2. dunfelroth 5. dunfelblau | | |
| 103 | Feder- oder Röhr-After. Beliebte, schön gefülte Form. | | | | 3. hellblau 6. braunvielet 7. rötblich lifa Sede Karbe à 500 Corn 5 Sax à Arife 11/ Sax | | |
| | 1. rein weiß 8. dunkelcarmoisin mit 2. silberweiß weiß | | | 151 | Sede Farbe à 500 Korn 5 Sgr., à Prife 11/8 Sgr. Diefelben gemischt 1000 Korn 8 Sgr. | 225 | 1 |
| | 3. weiß mit rothem Herz 9. himmelblau mit weiß 4. pfirsichblüthen 10. lisa | | | 152 | Neue Zwerg-Turban-Alfter. | | |
| | 5. rojenroth 11. violet 6. carmoifin 12. violet mit weiß 7. dunkelcarmoifin 13. dunkelblan | | | | buntelroth, weiß gefledt, die Blatter duntelbrann | | 2½ |
| 140 | 14. aschgrau Jede Farbe à 1000 Korn 5 Sgr., à Prife 1 Sgr. | | | 153 | Neueste Viktoria-Alfter. Bewiß bie schönfte aller Aftern. Die Alumen | | |
| 140 | Dieseiben gemischt | 75 | 1 | 2 | Gewiß die iconfte aller Aftern. Die Blumen biefer Gattung find imbriquirt, bochgewolbt-tugelbluthig, ftarkgefüllt und febr großblumig (bis 5 Boll). | | |
| 141 | Rugel-Aliter. | | | 7 | Der Sabitus der Pflanze ift febr robust, ppramiden- förmig. Die Pflanzen uniffen, wenn ein gutes Resultat erzielt werben soll, 14 Just im Quadrat | | |
| 1 | Die Blumen groß und regelmäßig. 2. fleischfarben | | 1 | 7 | Resultat erzielt werden soll, 11/3 Juß im Quabrat gepflanzt werden. Giebt sehr wenig Samen. | | |

| | | | - 1 | 2 = | | eoth | Pr. |
|------------|---|-------------|------------|-------------------|--|-----------|---------|
| 3(4 | | Soth Sgr | Pr. Sgr | 360 | | Sgc | Sgr |
| | 1. weiß 6. lilarofa 2. carmiurofa 7. hortensicuroth | | | 203 | Callirrhoea pedata nana, bon niebrigem Buchs und außerorbentlich reich und lange blubend | | 2 |
| | 1. weiß 6. lilaroja 2. carminroja 7. hortensicuroth 3. carmoisin 8. rein hellblau 4. hellblau mit weiß 9. rein dunfelblau, neu | | | 204 | " verticillata. Renere febr großblubende Species, | | 3 |
| | 5. buntelblan mit weiß 10. carmoifin mit weiß, nen | | | 205 | Companyla carnatica, carbat, Glodenblume, 20 F. | 8 | 1 |
| | 31. parlichbluthen, nen Rebe Karbe à 500 Korn 15 Sgr., 100 Korn 4 Sgr. | | | 206 | blan Beibe 1 Ff | ٠ | 1 |
| 153a | Diefelben gemischt 1000 Korn 15 Ggr., Ltb. 75 Ggr., Br. 24 Ggr. | | 100 | 207 | nnancirt. 2 FB | 4 | 1 1 |
| 154 | Acter tangcetifolius, rainfarublattrige Sternblume. | | 1 | 208 209 | fl. albo, weiß. fl. pl, gefülltblubend . pyramidalis. 624 F. Gine ber fconften, in langen | | 2 |
| 155 156 | Litajarben. 1 guß boch. "OFT | 7 | 1 | 210 | Rispen blubend | 12½ 15 | 1 1½ |
| 157 | 4 F. 2 Ff. hoch Melbe. GF. | | 1% | 211 212 | ", fl. albo, weißblüßend . " soldanellistora, 4 F. reigend schn | 4 | 2 1 |
| 158 | 4-5 Buß boch. Decorativ | 2 | 1 3 | 213 214 | A albo meißblübend | 4 | 1 1 |
| 159 | " graeca, (Griesbach). Reu. Diefe icone Grühlinge- blume ift eine werthvolle Bereicherung ber Grei- | | | 215 216 | grandiflora, großblumig | ^ | |
| 1.00 | landpflausen . Azalea pontica. hF. Von Prachtforten gesammelt . | | 10 | 217 218 | Aunei bicolor 10 Rorn 2½ Sgr. n fulgida | | |
| 160 161 | Baptisia australis, fübliche Bapt. 4 F. 3 Fuß, icon | | 1 | 219 220 | discolor floribunda 10 , 3 , | | |
| 162 | hellblau . Bartonia aurea, golbgelbe Bartonie . F | 4 | 1 3 | 221 | gigantes 10 m 3 m | | |
| 163 164 | Begonia diversifolia. 4 TF. Bracht. Gruppenpflange Bellis perennis fl, pl., Laufenbiconchen. *4 F. Bon | | 5 | 223 224 | ngalantiaca | | |
| 165 | ben schönsten bichtgefüllten Sorten gesammelt . Bidens atrosanguineus (Ortgies), Dahlia Zimapani | 1 | | 225 226 | " Mülleri | | |
| | (Roezel), OTF. Schine Gruppenpflange mit blutbraunen Blumen. Zeitig zu faen | | 3 | 227 228 | nigricans | | |
| 166 167 | Bocconia cordata, 24 F | | | 229 230 | " Sellowi | 5 | |
| | ganz besonders die lettere. Sie find prachtvoll | | | 231 | Cannabis sativa var, gigantea, chines. Riefenhanf OF. Deforative Gruppen und Gingelpflange | 131 | - |
| | belaubt, erreichen eine Sobe von 5-6 Fuß, und ertragen unfere Winter vollständig ohne Dede. | | 101 | 020 | Consider annum inquicher Rieffer, OTF. | 4 | 1 |
| 168 | Brachycome iberidifolia, iberisblättriger Rurzichopt. | | 1% | 232 | Die Frichte jehr giereno; in megteren Surietuten | 5 | 1 |
| 169 170 | , iberidifolia fl. albo, weißblühender R. Browallia abbreviata (pulchella). TF. Niedrige | | 1½ | 233 234 | coerulea fi. pl. Goone Salb Smmortelle gum Erodnen geeignet | 5 | 1 |
| 110 | reigende Bflange. Die gabtreichen Blumen buntel- rofenroth mit weißem Auge | 1. 7 | 4 | 236 | Celosia cristata, Sahnentanini. O 1 W. | | |
| 171 | , demissa, niedrig. Hellblau | | 1 | | 2. roig 4. purpurroth. | | |
| 172 173 | n. fl. albo, weißtlichend | | 1 | 237 | Jebe Farbe à Br. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1/2, Ltb. 5 Sgr | | 1% |
| 174 | firidengroßen, icarladrothen weiß geftreiften Brudten | | 3 | 238 | 1. schwefelgelb 3. told | | |
| 175 | Cajophora (Loasa) Herbertii, § TF. Drange fdarlad | | 2 | | 2. goldgelb 4. leuchtend purpur. Bede garbe & Br. 3 Ggr. | | |
| 176 | " Interitia, ziegelroth Betbe geboren gu ben verwenbbarften Schling- | 1 | | 239 | Centaurea americana, amerit. gibtenbitute. Or 1. | 10 | 15 |
| 177 | Calampelis (Eccremocarpus) punicea, bunfelrothe | | 2 | 240 | farbenen Strablenblumden | 21/3 | 1 |
| 178 | Scabra, fcarfe Co. Scharladroth | | 2 | 241 242 | depressa, 1—13 ob. v., tevyalt viaa | 5 4 | 1 |
| 179 | Calandrinia grandiflora, großblumig purpurroth. | | 1 | 243 244 | fl. roseo, rojenroth | 1 | 1 |
| 180 181 | speciosa, C. * OTF. Glanzend purpurroth umbellata, horte. Dunkelpurpur | | 2 | 245 246 | | | 3 |
| 182 | Calceolaria hybrida. T. Banteffelblume, pracht getieg., von Blumen I. Ranges. 1000 Korn 4 Sgr | | | 247 248 | moschata fl. albo, weiß, bijamdujtend. OFI | 4 | 1 |
| 183 184 | nan , 3merg -, von fraftigem, gedrungener | 1 | | 249 250 | suaveolens, wohltrecheno. | 8 | 15 |
| | Buchs, außerordentlich reichblihenb. Bon Blumer 1. Ranges 1000 Korn 4 Sgr | | | 251 252 | Centranthus macrosiphon, OFT. 13 8. 9. tolentoty | 4 | 1 |
| | Eine aussührliche Aulturanweisung für di frantartige Calceolaria steht gratis 31 | | | 253 254 | " fl. carneo, fleischjarben | 6 | 1 |
| 185 | Diensten. pinnata, OTF. 2-3 Bug hoch, hellgelb icon . | | 2 | 255 | Cerastium tomentosum, filgiges Horntraut. 4 F Die gange Pflange ift filberweiß und besonders | | 2 |
| 186 | , rugosa, strauchartige B. h TF. 500 Korn 10 Sgr., 100 Korn 24 Sg | r. | | 258 | Chaenostoma fastigiatum, *hOTF. 12/2 &. h., roth | | 2 |
| 187 | , scabiosaefolia. TF. hellgelb fruh und reich | | 1 | 258 259 260 | astig. n. aloo, ideipotitient | | 3 1 2 |
| 188 | Calendula Pongei fl. pl., gefüllt blühende Ringel | . 8 | | 200 | , | | |
| 189 | Calliansis (Coreonsis) Atkinsonii, pielblum, 20 F | r. 5 | 1 | | Sommer-Levkohen. | | |
| 190 191 | biolor fl bruneo bunkelbraun | . 6 | 1 | | (Cheiranthus annuus.) | - | |
| 192 193 | nana, niedriges. * 3/4 &B. h | . 7 | | | Befte Qualität in Töpfen gezogener Samen. | | |
| 19: | atrosauguinea, bunfelreth | . 20 | | | 8 Sunfelcarmeifinroth | | 2 |
| 19 | | | | | 2. roja mit gelbem Schein 9. blagblau mit gelb. Schei | n | 2 |
| 19 | | . 8 | 1 | | 4. carmin 11. bellviolet | | 1 |
| 19 | gelb und braun | . 4 | 1 1 | 1 | 6. buntelziegelroth 13. buntelblau | | |
| 20 20 | Callirrhoea pedata, OFT. Carmoifintoth | . 8 | 3 1 | 1 | 7. carmoifin 14. ounteiotaun | | |

| No | | oth Br | | | Soth Son | Br. |
|------------|---|---------|-------------|---|----------|---------|
| 262 263 | | 0 15 | 279 | unter ben Levkohen. 1. reln weiß (neu) 6. hellblau 2. canariengelh, Ladblatt 7. dunkelblau 3. damols 8. rethbraun 4. dunkelroja 9. schwarzbraun 5. carmiu 10. weiß mit rosa Anhauch 3. des Farbe à 500 Korn 5 Sgr., à Prise 23 Sgr. | Sgr. | 8gr. 2 |
| 264 | Großblumige englische Sommer= Levkohe. Sehr empfehlenswerthe Levkope, ausgezeichnet | 12 | 280 | Pleue Bouquet-Sommer-Levfoye. Durch stärfere Berzweigung und längere Bluthe- | 00 | 2 |
| | burch robulten Winch and Lange Müthegeft. 1. weiß 2. steischarben 3. cararienis 9. dunfelkarmoisinroth, (neu) 4. aurorafarben (neu) 10. hellblau | | 28: | zeit ausgezeichnet. 1. rojenroth 3. hellblau 2. carmoffin 4. bunfelviolet 3. de Farbe à 500 Korn 5 Sgr à Br. 2% Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 8 Sgr. | 52 | 2 |
| | 5. rofa 11. violet 6. carminrofa 12. dunkelblau 7. carminroth 13. ziegelroth | | 282 | Engl. Herbst- oder Bastard- Levkone. | | |
| 265 266 | 14. dainois Jebe Farbe à 500 Korn 4 Egr., à Pr. 2½ Sgr. Diejelben gemischt 1000 Korn 6 Sgr | | | 1. weiß (mit Lackli.) 2. resentoth 6. dunkelblau 3. carmin 7. seifchfarben 4. carweisiureth 8. ziegetreth 3ete Farbe à 500 Korn 7% Sgr., à Pr. 3 Sgr. | | |
| 267 | Neue großblumige Sommer- levkone. | | 283 | Diefelben gemischt 500 Korn 6 Ggr | 80 | 25 |
| | ichwefelgelb, febr fcon, 25 R. 2 Gr., 100 R. 74 Ggr. | | 284 | Frühblühende englische Gerbst- Levkone. | | |
| 268 269 | Rwerg-Sommer-Levkohen. 1. fleischfarben 2. carmin 3. fupferfarben, großbl. 3. fupferfarben, großbl. 3. feb Farbe à 500 Korn 5 Sgr., à Br. 24 Sgr. | - | | Die frühblübenden Berbst-Levtopen sind febr ju embfehlen. Mitte Marg ausgefaet und Unfang Mai verpflangt, entwickeln sich ibre Blütben Unfangs August, und blüben, bis sie ber Froft gerflort. 1. bunkelblau 4. blabblau | | |
| 270 | Mene Zwerg-Phyramiden-Sommer | 2 | 285 | 2. carmin 5. braunviolet mit Lackl. 3. weiß 6. carmin mit Lacklatt Sede Farbe à 500 Korn 74 Sgr | 80 | 3 21/2 |
| | Verfoje (großblumig). Gegen 9 3off hoch, außerordentlich ichon. 1. apfelbluthen 5. helblau 6. dunfelblau 3. brillant rafenrach 7. rethieran | | 286 | Levkoye. | | |
| 271 | 3. brillant rosenroth 7. rethbraun 4. carmofin 8. afcharau Bede Farbe à 500 Korn 73 Sgr. Dieselben gemischt 500 Korn 6 Sgr. | 3 2½ | 1 | Die großblumigen Kalier-Levkopen übertreffen bie alteren Sorten burch größere Blumen und schöneren Bau; blüben auch zeitiger als lettere. 1. rein weiß 5. carmiuroja 2. brauptioset 6. belblau | | |
| | Neueste Riesen= oder Baum-Som= mer-Levkohe. Bis 2 Buß und mehr boch, sehr reich und lange | E | 287 | 3. pfirsichblüthen 7. blahroth 4. roja (kugelblüthig) 8. carmoifin Rede Farbe à 500 Korn 73 Spr | 80 | 3 2½ |
| 273 | Sin schen Garben gemischt 100 Korn 4 Sgr Engl. Sommer-Levk. mit Lachblatt. | 2% | 288a | Berbesserte Winter-Levkope. (Cheiranthus incanus.) Schöne Sorten, die große Stöde bisben, und | | |
| | 1. weiß (fugelblüthig) 2. ichwefelgelb 8. violet 3. fleiichfarben 9. bunkelviolet 4. pürlüchblüthen 10. bunkelblan | | | gut zefüllt fallen. 1. weiß 2. jchwefelgelb 6. helblau 3. roja 7. bunkelblau 4. feuerroth | | |
| | 5. carmin 11. rethbraun 6. dunkelcarmoisin 12. schwarzbraun Sede Karbe à 500 Korn 4 Sgr., à Pr. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 6 Sgr. 40 | 1½ | 288b 289 | Nebe garbe Diejelben gemischt 500 Korn 5 Sgr | | 21/2 |
| 76 | 20 3mmerbl. Sommer = Levkope. Bei biefer & läßt sich durch Ausschneiben ber | 100 | | Levkoye. Extra in's Gefüllte fallende Sorten. | | |
| | abgeblidten Blumenstiele der Flor vorzugsweise Lange ausdehnen. 1. weiß 5. rothgrau 2. sleighfarben 6. dunkelbsau 3. ziegetroth 7. rothbraun | | 290 | 1. königeblau 3. weiß 2. carmin Jede Farbe 100 Korn 24 Sgr. Dieselben gemijcht à 500 Korn 5 Sgr. | | 2 |
| 277 | 4. carmoifin Bede Farbe à 500 Korn 4 Sgr. à Pr. 2 Sgr. Dieselben gemischt 1000 Korn 6 Sgr 45 | 1½ | | aniniut. Let. | | |
| ?78 | Nene großblumige Phramiden- Sommer-Levkope. | | 291 | (Cheiranthus Cheiri.) Golblad, ertra gefüllter brauner Stangen- 1000 Rorn 10 Sgr. 100 " 11%" | | |
| | Diese Züchtung ist wohl das Bolltommenfte | | 292 | , , , canartengelber , 1000 Korn 25 Ggr., 100 R. 3 Sgr. | | |

| | | | 14 | | | Pr. |
|------------|--|----------|------------|------------|--|------|
| | 18 | oth | Br. | No 1 | Ser 1 | Sgr. |
| Re | | Sgr | Sgr | | Convolvulus tricolor, splendens. Präcktig illaroth, violetroth und | 1 |
| 293 | Bolblad, extra gefüllter, 1000 Korn 25 Ggr. , , , blauer (violetter) Stangen. 1000 Rorn 25 Ggr. | | - | 356 | indigoblau mit hellem Grunde | 1 |
| 294 | brouner 3merg Bufch 1000 " 15 " | | | 357 358 | Cosmea bipinnata, OTF. purpurea, purpurroth purpurea, purpurroth The cosmea beautiful and the cosme | 1 |
| | ", ", blauer 3werg=Busch" 100 " 25 " 100 " 3 " | | | 359 | Cosmidium Buridgeanum, OFT. 2 & hoch, schwarz | 1 |
| 295 | | | | 360 | Cosmidium Buridgeanun, OFT. 26. 4cm/ (50. 5. 7. 1. 2. 4. 4. 7. 7. 5. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. | 2 |
| 296 | " " broncefatbiget Sulay 100 " 3 " | 0 | 1 | 361 | glungen gen hach schon goldgelb | 1 |
| 297 | | 10 | 1½ | 362 | Crucianella stylosa, 41 auß und bilbet gute Gin- | |
| 298 299 | gewöhnlicher brauner Buich, ohne Bebedung im | 4 | 1 | | fassungen Cucurbita, seltene und schöne Arten, | 1 |
| 300 | Freien aushaltenb . Meerftranbe-Levtone. * F. Cheirauthus maritimus, Meerftranbe-Levtone. * F. | อย | 1 | | Cucumis und Cheurotta, fette 9. | |
| | 1/1 gus hom, lebhall toto | 25 | 1 | 363 | Cuphea eminens, horf. practivou so wour 22 350 | 4 3 |
| 301 | Chelone (Pentastemon) barbata, 4011. | 8 | 1% | 364 365 | Cuphea emiens, hoTe, practivoll 50 Korn 25 Egr. Cuphea emiens, hoTe, practivoll 50 Korn 25 Egr. Galeottiana. Blume fati ichwarz miniata, meunigroth. Eine der ichönsten Arten platycentra. Befannte reichblüßende E. | 4 |
| 303 | chenopodium Atriplicis. OF. 4-5 Ff. hohe Grup- penuflanze | 6 | 1 | 366 367 | " Zimapani. Reu. 4 Jug hoch. Großblumig | 2 |
| 304 | | 5 | 1 | 368 369 | | |
| 305 | | 10 10 | 15 | 303 | " belaubte Schlingpflangen. Die gurtenagnungen, febr feinschmeckenben Früchte werden eingemacht. | 5 |
| 306 307 | carinatum arrococcineum | 5 | 1 | 370 | Cynoglossum coelestinum, himmelblan. "3 OFT 3 | 1 |
| 308 309 | " " Dungtti A nl (Mefullt meth | | 2 | 371 372 | linifolium, weiß. Or. 25 Rorn 24 Sgr. | |
| 310 | venustum. Purpurreth mit gelb und | 4 | 1 | 373 | ramosissimus superbus 25 " 25 " Betbe icon gelb und reichblübend. | |
| | Cammtliche Carinatum-Barietaten partiten. | 3 | 1 | 374 | | |
| 311 312 | coronarium fl. albo pl., meiß gefüllt | 4 | 1 | | großen, weißen und bietetten - 7 | 1 |
| 313 | , japonicum fl. pl., 4 T. barurt bebeutenb, ib bab | | 6 | 375 | fastuosa Huberiana varietates, | |
| 314 | Cineraria hybrida, 40 bon Stumen 1. Stunges ge | | | | | 2 |
| 315 | 2 Wichanklume hen fehr gedrangten | | | 370 | ben, biefelben gemischt | 1 |
| | Buchie | | | 37 | 2 7 a a la michria delhaetulli | 2 |
| 316 | " | | | 37 | humilis flava n. pi., necetig Allends buftenben Metel, mit großen, weißen, Miends buftenben Blumen. 3 Buß bod) | 1 |
| 317 | in vielen fabrie Gutch and 500 Korn 4 Sgr. Clarkia elegans, OFT. | 3 | 1 1 | 38 | Blumen, ohr groß und duftend, weiß | 0.1 |
| 318 | | | . 1 | | meteloides. Studies feys 3.5 meteloides. Stud | |
| 319 320 | n violacea fl. pl., violet | 2 2 | 5 1 5 1 | 38 | punicea, buntelroid . nl., bober gefüllter | 1 |
| 321 322 | " alba, weiß Rarijet noch | 900 | 2 | 383 | Delphinium Alacis etation in properties in Satter, jebe Diejelben gemischt 20 Diejelben gemischt Ajac. nanum fl. pl., niebriger gef. R. 6 c. wöchtlie Farben, iebe 6 | 1 |
| 323 | marginata, practi. Battetut | | 1 | | Dieselben gemischt 21 | ¥ 1 |
| 324 325 | " " fl. pl. Baritrt noch | | 5 1 | | Ajac. nanum fl. pl., niedriger get. M. | 1 |
| 320 32' | | . 10 | | | Ajac. nanum I. pi., netten, jebe | -1 |
| 32: 32: | Clematis erecta, AF. Eine bubiche Staube | | 2 | | Ajac hyacinthinorum a. pr., yy | 1 |
| 33 | Clianthus Dampieri, Dampier's Practivitie. 241 | e | | | 10 garben, leve | |
| | Pflanze ift fehr empfindlich gegen anhaltende Naffe 5 Korn 2 Sgr | | | 38 | 6a Consolida fl. pl., gefüllter Levtoyen 10 | 1 |
| 33 | Brillant icharlach, 5 Korn 5 Sg | r | 100 | 38 | Biston, level | |
| 33 | puniceus, buntetroto | | 100 | 3 | 87 , cardiopetalum. Biolet | |
| 33 | letten Fleden, ichen | | . 1 | 3 | Leuchteno blan in manney and . | 11: |
| 33 33 | pulchena aroa, reciblid, praditig | | | | | 3 |
| 33 33 | azurea grandinora granein raid mad |)= | | 3 | 91 Hendersoni, justice Suttains 50 Rorn 4 Egr. | |
| 0.0 | fende, icone Rietterpstanze mit gugttetchen, bie | 1 | | 2 3 | 193 , Mile. Jeanne de Rohan pri | . 1 |
| 33 | | r | | | 95 , formosum, O4F. Straplend indigeblin, geop | 6 |
| | und reizenden buntelcarminrothen glängenden Frud | b = . | 12 | | bluttig, Jan 11 Cas An R Miele | 2 |
| 0 | ten | iB | 2 | 1 | practige garben genilte fallend | 0 |
| 3 | | : | 2½ 4 | 1 | 398 atrosanguineus, leuthten Barten-Relfe, 22F. | 9 40 |
| | 11 candidissima, teinbete | | 4 3 | | 399 "caryophyllus fl. pl., gefullte Ontre On Rummers 400 "ertra gefüllte Topf-Relfe. Bon Rummers | |
| 3 | multicolor, vielfarbig . Meiß mit rosa | | 4 2 | 1 | binneig A pl gef. Chinesernelte. * & FT | 6 |
| 3 | 45 Collomia coccinea, scharlachrothe Coulomie. Or. | | 8 | 1% | 402 , fl. albo pl., meightugent get | |
| 3 | aroa, nethorithlinenh | | 8 | 2 | 404 fl. rubro striato pl., totogettetto Caffernelfe | |
| 5 | 48 " striatiflora, geftreiftblüchenb | | | | imperialis fl. pl., großeitmige gestaufertiete in prächtigen Müancen . 406 plenissimus pictus. Reu. Diese Bartetat ist plenissimus pictus. hie bie seinste schotliche | 7 |
| 4 | 49 Convolvulus mauritanicus, \$4TF. Bottreffich | | | | | |
| | tieen geeignet . Blau u meif mit gelbem Grur | ibe | 11/2 | 4 | Febernette. 100 Korn 23 opt. | 1 |
| | tricolor, OF. Blau u. weiß mit geteen Can | | 3 | 1 1 | gebrungenem Bau | 8 |
| | standing and all the transfer of the standard and the sta | | 11/2 | i | | 12 |
| | monstrosus. Reu, tief bunteibini | | 2 | 11 | 409 Heddewigh. Gebt gebruikig | |
| | speciosus atropuipuieus, layen | | | | | |

| Jin | | Loth | |) Tin | l . | Lot | ı Pr. |
|-------------|--|--------|----------|-------------------|---|------|-------|
| 411 | Dianthus chinensis , , laciniatus, geschlitztblättr. Cehr großblumig . | 8gr 12 | Sgr. | 464 | Gentiana acaulis. *24F. | Sgt | Sgr |
| 413 | plumarius, Keber-Relfe, *21F. Bef. Affange für | | | | Berlangt Kenchtigfeit und Wagrerbe | | 25 |
| 414 | " fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), bet. schone | 3 | 1 | 465 466 | Gilia achilleaefolia fl. roseo. OF Gina nene refere | | 15 |
| | Relte mit prachtv. Zeichnungen. 100 Korn 10 Sgr., 25 Korn 3 Sgr. Dictamnus albus, weißer Diptam. 2–3 Fuß. 24F. | | | 467 | , capitata, forfformige Bilie. 24 Sub hach | 3 | 2 |
| 416 | | | 21/2 | 468 469 | major nivalis . laciniata. Neu. Nur ½ Fuß hoch . | 4 | 1 |
| 417 | Digitalis Buxbaumi. 4—5 fins boch. 64F. , ferruginea. Der Blütbenftengel bildet schöne, | 10 | 1 | 470 471 | , laciniata. Reu. Aur & Fuß hoch | 3 | 1 1 |
| 419 420 | jchlanfe Byramiden. 5—6 Fuß. " gloxiniaeflora. Brachtvolle großbl. Barietät. | 7½ | 21/2 | 472 473 | , fl. albo | 25 | 1 |
| 421 422 | purpurea | 6 | 1 1 5 | 474 475 476 | fl. roseo, rosensarbig. Glaucium luteum. 4FT. | 25 | 1 1 |
| 423 | Dolichos giganteus. SoTF. Burpurroth, gur ichnellen Befleibung hoher Gegenstände. Gebr raid machjend | • | 2 | 477 | , phoenicenm . Beibes hubschelaubte Stauben. Globularia trichosantha. 24F. Bfiange mit nieber- | 4 | 1 |
| 424 | " Lablab Mit 4 Sug hobem, windenden Stengel und gierlichen rothlichen Bluthen | 5 | 1% | | liegenden Blattern, aus welchen fich bie ichonen blauen Blutbentopfe gabtreich erheben. Ertragt | | |
| 425 | Die Dolichos verlangen eine warme Lage. | | 3 | 478 | bie strengsten Winter | | |
| 426 | pracocephatum moldavicum. (.) FT. 18-2 FB. b. | 21/2 | 1 | | Von Blumen I. Ranges gesammelt. 250 Korn 5 Sgr. | | |
| 427 428 | blau , fl. albo, weißblubenb , virginianum, 4F. Sellpurpur, an feuchten Stand- | 21/2 | 1 | 479 | Bon Blumen II. Ranges. 250 Korn 14 Sgr. | | |
| 429 | orten 5-7 Ff. hoch und fehr becorativ Dipteracanthus spectabilis. 2TF mit schönen, tief. | | 2 | | Wir acquirirten die gange Camenernte von einer vorzüglichen, mehrfach durch den Gartenbau- | | |
| | blauen großen Blumen, empfehlenswerth. 25 Korn 3 Sgr. | | | 400 | berein pramiirten Cammlung und fonnen bie- | | 10. |
| 431 | Eccremocarpus fiebe Calampelis. Echium creticum. OTF. Mit icharlachrothen, in violet übergebenden Blumen und langdauernder Bluthe- | | | 480 481 482 | amoena fl. albo | 3 | 1 |
| 432 | Emilia (Caculia) sonchifolia a FT Caculia | 4 | 2 | 483 | elbe jehr empfehlen. Godetia amoena. F. 1½—2 H. h. " amoena fl. albo " Lindleyana. Blaspurpur " fl.ppl., gefüllt. ——————————————————————————————————— | 3 | 1 2 |
| 433 | Sommerblume | 8 | 1 1 | 484 | , rubicunda splendens. Lilaroja mit purpurrothem | 1 | |
| 434 | r, fl. luteo, gelbe | 0 | 13 | 485 | Gomphrena globosa alba, weißer Rugel-Amarant. | 5 | 1 |
| 435 | Eriogonum umbellatum (Torrey). F. Intereffante | - | -/3 | 486 487 | , , carnea, fleischfarbig | 5 | 1 1 |
| | in Dolben ftehender fleiner ichluffelblumfarbe- | . 1 | | 488 489 | Tr W. , carnea, fleischfarbig , rubra, purpurroth , variegata, bunt , Haageana (aurantiaca), orangefarben | 5 | 1 |
| 400 | ner, febr oft mit orangebrann punftirten Blu- men. 25 R. 3 Ggr. | | | 490 | Grammanthes gentianoides. OTF. 3-4 3oll bod, | | |
| 436 | Erodium Manescavi, 1 8f. 4F. Burpurroth, prachtig und ben gangen Commer blubend. Die Camen | Î | | | nberaus zierliche Sommerblume für sonnige, | | 5 |
| 437 | eignen fich vortrefflich ju Ongrometern Erysimum Perowskianum, leucht. orangefarben OF. | 3 | 21/2 | 491 | Gypsophila elegans. ⊙ F. 11-2 §f., blufrofa , muralis. "⊙E T. Riedrig, febr reichblihend | 6 | 11/2 |
| 438 | Erythrina crista galli, Rorallenbaum, hTF. Befannte Brachtpflanze | - 1 | | 493 | " paniculata. 4 F. 2 - 3 Ff., rothlich-weiß. Die gier- lichen Blumen bilben einen wesentlichen Be- | | |
| 440 | Eschscholtzia californica. *OF. Glangend gelb und feurig crangefarben alba, weißblubend | 3 | 1 1 | 494 | ftandtheil für leichte Bouquets , Saxifraga. OFT. Den gangen Commer hindurch | 5 | 1 |
| | | 3 | 1 | 495 496 | , Saxifraga. OFT. Den gangen Sommer hindurch blübende afterliebste Zwergform . Hedysarum coronarium. OET. 2 Hb, hochroth | 4 | 1 1 |
| 443 | mit purpurroth | 4 7 | 1 1 | 497 | fl. albo, weißbinhend . Helenium Douglasii. F. 11-28f., lebhaft citronen- | 6 | 1% |
| 444 445 | ", crocea, latrangetb Eucharidium grandidorum. "F. 1½ H. hoch, tosa mit purpurreth " album, weiß " roseum, rolafarben Eucnide bartonioides. OTF. Rieberliegend, groß- blumia, lebhaft citronengelh | 7 | 1 | 498 499 | Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Connenblume. OF. argyrophyllus . | 4 | 1 1 |
| | blumig, lebhaft citronengelb. Reiner Same 1, Lth. 15 Sgr. Eutoca viscida. Of. 1-2 8h. h., leuchtend smalt- | | 3 | 500 501 | , argyrophyllus | 6 | 1 |
| 446 | Time, in actually tragelly | 4 | 1 | 502 | " giganteus, Riesen- nanns fl. pl., gefüllte Zwerg- Helichrysum brachyrhynchum, filberblättrige Strob- blume. O E T. | 5 | 1 |
| 448 449 | " Ortgieslana. Riedrig, Illa mit weiß " " Wrangeliana. Hellblau Evonymus simbriata. L.T. Neue aus Japan eingeführte | 4 | 1 | 1.00 | blume. ⊙ET. , bracteatum album | 10 5 | 2 |
| 450 | Species mit febr hubscher Belaubung , japonica | 3 | 4 1 | 505 506 | mencurysum bracteatum monstrosum fl. pl. getullt | 5 | 1 |
| 451 451a | n n fol. arg. var. n fol. aur. var. | 6 | 1 1 | 7 | 1. rein weiß 2. orange-scharlachroth 3. dunkelrothe Rüancen 6. purpurrothe Rüancen | | |
| 452 | Beides befannte harte Deforationspflangen. Fenzlia dianthiflora, *OTF. 2-3 Boll bod, blafilla- | | | | 3. duntetrothe Ruancen 6. purpurrothe Ruancen 7. rosenroth. Sede Farbe à Brise 11/2 Sgr. | | |
| (5) | farben, im Schlunde gelb. Eins der reizendsten Sommergewächse, besonders für garte Einfaf- | | 3 | 507 508 | Diefelben gemischt | 12 | 1 |
| 453 | Fritillaria imperialis, Raiferfrone. 2 Fuß. 4F | | 5 1 | 509 | atrosanguineum nanum, bochroth, ertra | | 2 2 |
| 494 | Gaillardia aristata, gegrannte Gaillardie. 2F. 2-3 F. | | 2 | 510 511 | , , , , fl. pl | | 21/2 |
| 457 | , bicolor, zweifarbige G. O4TF, 2-3 Fb. h grandiflora . Die prachtvollste bleser Gattung. Bariirt etwas. | 6 | 2 | | monftrofen helichtpfen zu ben werthvollften Sin- | | |
| 458 459 | , lyrata, leterblattrig | 5 | 1½ | 513 514 | mortellen Helleborus abschasicus. 4F. Abschafische Riegwurg | | 3 |
| 460 461 | " marginata, weißgerandet, prächtig | 7 8 | 15 15 15 | 515 | " atrorubens bybridus, fcon | 10 | 3 |
| 462 463 | " picta. T. Beliebte Zierpflange. " marginata, weißperanbet, präcktig. " Josephus. 4F. Großbluntg, ichön . " Vernierii. Sehr reichblühend Gaura Lindheimeri. 24FT. 3-4 F. h., röthlichweiß in langen ichönen Rispen blühend | 5 | 1 1 | 516 517 | Heracleum giganteum. 6-8 §\$. 4F. | 5 | 1 |
| 1 | in langen iconen Rispen blubend | 5 | 1 | | Mattpstanzen von riesigen Dimensionen Hesperis matronalis, rothe Nachtviole. 4F. | 4 | 1 |
| | and the second s | 1.6 | | | a | 2 | 6 |

| | —————————————————————————————————————— | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|------|-------------|--|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| 7km | | Loth | Br. | Na | | Sorth Sgr | Pr. Sgr | | | | | |
| | Hesperis matronalis | Sgr. 5 | Sgr. | 556 | Ipomoea Quamoclit (Quam. vulgaris.) \$OTW. | | 1 | | | | | |
| 519 | " Beibe errragen fcattige Stanborter. | 6 | 1 | 557 | Mit gefiedertem Laube, ausgezeichnet icon u. zterlich. Ipomopsis Beyrichii. & TF. 3-4 BB. b. icharladr. | | 11/3 | | | | | |
| 520 | " Befannt und beliebt wegen bes foftlichen Duftes, | | | 558 559 | elegans, rothblubeno | | 15 | | | | | |
| 521 | welchen sie Abeuds verbreitet. Hibiscus calisurus, großblumiger Gibisch. OTF Rieracium aurantiacum. IF. Sehr schone bril- | 4 | 1 | 560 561 | superba | | 1½ | | | | | |
| 522 | | | 21/2 | 562 | tigiten und gartfarbigffen Spotiven | lon. | 2 | | | | | |
| 523 524 | Humea elegans. &TF | | 3 | 563 | gelb gestectt | | 2 2 | | | | | |
| 1 | veracee mit großen, tulpenartig gestimten, teuchten | -01/ | 3 | 564 565 | Tavifuesia melloides, blaue Kaulfuffia. *OFT | - 5 | 2 | | | | | |
| 525 526 | Iberis amara, meiße Schleifenblume. OF, odorata, wohlriechend, weiß | 2½ 2½ 3 | 1 | 566 | " " " des (Hardenbargia) ovata lilacina. bT. | 6 | 1 | | | | | |
| 527 528 | alba, weiße Cd | 3 | 1 | 567 | Brachtige Barietat ber iconen alteren Species. | MIL | 100 | | | | | |
| 529 | " Dunetti, prachtig purpurrotty | 4 | 1 | 568 | , fl. roseo. 10 Korn 11 Egr. Lagenaria, fiebe Cucurbitaceen Gette 9. | | ACT. | | | | | |
| | Balfaminen. (Impatiens balsamina.) | | | 570 | Lasthenra glabrata. OF. 1-12 38., Jubit geogete | 5 | 1 1 | | | | | |
| 530 | Wefüllte Raliaminett. | 111 | 657 | 571 | n. aibo, tein weipeingene, fege 149- | 7% | 2 2 | | | | | |
| 000 | 1. weiß 5. weiß mit violet | | 1990 | 573 574 | " roseus " mauritanicus. Reue Art, große purpurrothe | 10 | 2 | | | | | |
| | 2. jantitay 7. hochrofa 3. ilia 4. dreifarbig (weiß, Ilia 8. carmoifin. | | | 575 | Blumen odoratus, moblriechende Wide. OF. 4-5 Bug, | | | | | | | |
| | und rold) | | | | niederliegend. 1. weiß 5. schwarzpurpur 2. roth mit weiß 6. schwarzburpur mit helbkau | 1 | | | | | | |
| 531 | Dieselben gemticht 500 R. 1/2 Ggr., 100 R. 2 Ggr. | | | | 3. roth geftreift 7. fcmargbrann geftreift. | 125 | | | | | | |
| 532 | Rosens (Andrieux)- Balsaminen | | 111 | | 4. dunkelroth Jebe Farbe à Lith. 1½ Ggr., à Br. 1 Sgr. | 1 | 1.1 | | | | | |
| | Großblumig biditgefüllt. 1. buntetblau 5. lita | | - | 576 | Dieselben gemijcht à Bid. 12h Sgr | 4 | 1 | | | | | |
| | 2. rein weiß 6. meth mit rofa Schein 7. btaggelb | | | 578 | Laurus nobilis. &T. Der echte Lorbeer. | 2 | 15 | | | | | |
| | 4. apfelbluthen 8. chambis. | 000 | | 579 | A. albo, weiß | 2 | 1 | | | | | |
| 533 | Diefelben gemischt boo R. 10 Ggt. 100 dt. 24 Cgc. | | | 581 | gelb | 3 73 | 1 1 | | | | | |
| 534 | Camellien-Balfaminen. (Andr.). punttirte Rofen-, großblumig, dichtgefüllt. | | 14 | 582 583 | hybridus. Neu, in prächtigen Runnen | . 15 | 2 | | | | | |
| | s should mis main A rola mit mein | L | de | 584 | consission of F i T. Befannt | | 1 | | | | | |
| | 2 carmailin mit meiß 6, lila mit weiß. | | W. | 585 | "Brachtlife für Lande und Topffultur Rorr giganteum, Riefenlifie. 8—10 BB. 4T. 50 Korr | | 2: | | | | | |
| 535 | Bede Farbe à 100 Korn 4 Sgr., 25 Korn 11/ Sgr. Dieselben gemijcht 500 K. 10 Sgr., 100 K. 24 Sgr. | (i) | 1 | 586 | Charlenband OIF | | 11 | | | | | |
| 536 | Gefüllte Zwerg-Balfaminen. | | 00 | 587 588 | Limnanthus Douglasii. Off. 2 60, 10th and 8 | | 1 | | | | | |
| | 1. pfirsicblüthen 5. purpur 2. weiß mit violet 6. weiß mit scharlach | | 100 | 589 | | | 1 | | | | | |
| | 3. dunkelblau 7. fleischfarben | 044 | | 59 | " splendens. Meu, practing cuntervite | . 5 | 1 | | | | | |
| | Jede Farbe à 100 Korn 4 Sgr., 25 Korn 11 Sgr. | 10 | | 593 | principal protect party of E | . 4 | 2 | | | | | |
| 537 538 | Impatiens glandungera, orninge Surfamities Of | ur | | 59 | | | 1,4 | | | | | |
| | Berbedung uniconer Zaune u. j. to. Bettungt | 16- | 2 | 59 | flavnin, gelb, perennirend 14-2 guß boc | 6, | 2 | | | | | |
| 539 | | | 2 | | leuchtend, duntelcarminroto | | | | | | | |
| 540 | ", chinensis grandiflora, jehr großbluntig, cunte | | 2 | | 8 perenne, perenn. 2-3 gus god | | 3 1 | | | | | |
| 54 | Tananathina agaile TE | 3e. | 1 | 59 60 | O Lisianthus Russellanus (Gentlanee). O Inc. | ie g | 1 | | | | | |
| | Speliblan. | Tr. | 4 1 | | THE HAVE STEEL STE | r. | 1/1 | | | | | |
| 54° 54° | hedernes (Nil) produtio himmelbl. & FTW | | 4 1 | 60 | Tabalia arinoides blaubl niedr, Lobelie, "OTF | | 1 | | | | | |
| 54 54 | atroviolacea, cuntelpiplet, ibeth umfuntt. | | . 1 | 14 60 60 | Brinus compacta alba, reth meis. Muge Reu. | | 1/2 | | | | | |
| 54 54 | grandiflora, greabl, bellblau | | 75 1 | 15 60 | n Paxtoliala, illiatie illia Reichel | a | 11 | | | | | |
| 54 54 | grandiff. alba, gregot. weiß, utmogrange | | 1 | 14 60 | intentin bunfelhlan, m. rein ibeikent au | 116. | | | | | | |
| 55 | " lanchosperma. Neu. §4TF | | . 14 | | 7 fulgens, 1½—2 Suß, breunend scharlach. 4TF. gracilis erecta. *OTF leberaus reichblübend u. von gebrungenem Bo | | - 11 | | | | | |
| 55 | ben Ipomben mit prachtigen Blumen | g, | - 1 | | Dindleyana, rojafarben | | 6 | | | | | |
| 55 | nurnurroth init bellem Rande | | | 14 6 | ramosa, blau | | | | | | | |
| 52 | purpuren. Soll. Hogwadien und gegenden 26. | 8= | | 6 | 11 , fl. albo, rein weiß | 6 . | | | | | | |
| - | 1. rein weiß 5. heustnettung | | 2 1 | | 15 Lophospermum scandens. Sollenmiger Rofen | 2C. | | | | | | |
| Ŷ | 3. weiß m. violett. Etreifen 7. prachtontututint | th | 10 | | Blubt bis jum Gintritt ber Brotte ununterbroch | cirt | | | | | | |
| | 4. roja. Sebe Farbe à Lth. 4 Sgr., à Prije 1 Sgr. 55 Diejeiben gemijcht à Lth. 2 Sgr., à Pr. 1 S | gr. | 1 | | 16 Lotus Jacobaeus. 91r. 2 38. buntistuun maan 17 , fl. luteo, gelbblühend | | . 1 | | | | | |
| 5 | Diefelben gemischt a Eig. 2 Oge., a per 2 | | | | | | | | | | | |

| R | | Loth Sgc | Pr. |) Ro | | Loth | Pr. |
|------------|--|-------------|---------|------------|--|-------|--------|
| 61 | Luffa, siehe Cucurbitaceen Seite 9. Lupinus affinis. OTF. In blauen Trauben blubend | 3 | 1 | 686 | | | Oyl |
| 61: 620 | | 3 | 1 | 687 | Morina longifolia, 2LTF, 1-2 Sh referrath from " | | 2 |
| 62 | Hartwegii, 1%-2 &k. blon und meift | 3 | 1 | 688 | therefore the same and the same | 1. | 5 |
| 623 623 | n, fl. albo, weiß. Reu | 3 | 1 | 689 | grantetotan, fut Bruginggaruppen | 10 | 15 |
| 624 625 | n n n. rosco, to a ato | 3 | 1 | 690 | azorica 210T Brächtig hungaria | 8 | 15/2 |
| | ladrothen, weißgespisten ichonen Llutbenrispen- Richt mit abbo coccineus zu verwechseln, von | | | 691 | meiß mit blanvioletten Stricken | | 11 |
| 000 | weicher fie ganzlich verschieden | | 5 | 692 693 | | | 1 |
| 626 627 | , nigrescens, neue, febr duntle Sorte | 2½ 3 | 1 | 694 695 | , bicolor, zweifarbig | | 1 |
| 628 629 | Moritzianus, bunfelblau | 2½ 2½ | 1 | 696 | Nemophila atomaria. * OF Reis mit Commen | | 1 |
| 630 631 | nanus, 2merge 1—14 Sub | 1 | | 697 | , cramboides, blafblau | 2½ | 1 |
| 632 633 | " fl. albo, weißbinbend, zwergig . " subcarnosus, blau mit weiß, röthlich punktirt, nur 14-1 86 food | 2½ 3 | 1 | 698 699 | | 2½ | 1 |
| | nur 1/2-1 & hod . Lychnis chalcedonica, scharlachr. Lichtnelfe. 38.24F. | 10 | 1 | 700 | TOUGHT | 25 | 1 |
| 634 635 | fl. albo, weiß | 2½ | 1 | 701 | , marmorata, ichwarzbr., weis marmoritt und | 3 | 1 |
| 636 637 | grandiflora gigantea Neu 2meinal in arofa | | 2½ | 702 | gerändert , vittata, buntelichmarzbraun mit breitem mei- | 3 | 1 |
| | Sungeana, in beilmiebenen garben. | | - 1 | 703 | , insignis, bimmelblau, im Grunde meis Menny | 2½ | 1 |
| 638 | Haageana hybrida, glangend purpur nnaneirt | -1 | 21/2 | 704 | alle mais | 1 | |
| 639 640 | Lythrum roseum superbum, prachtig rojenroth 4 bis | | 3 | 705 706 | , maculata, weiß, blau gefledt, großbl. 2f. 124 Egr. grandiflora. Reu. Ein Samling von ber be- | 15 | |
| 641 | Macheranthera tanacatifalia of Our | 20 | 15 | | idiliten N. maculata mit Pilitten, molche | | |
| 642 643 | Malone grandiflors. OF Surperson | | 4 | 707 | , purpurea, geft. purpurroth. Neu und ganz | | 25 |
| 644 | glabra. Malope grandiflora. OF. Purpurroth alba. weightlusend Beliebte Zierpflangen, febr geeignet zur Befleidung | 21/2 | 1 | 708 | niedrig | 4 | 1 |
| | pon Rosenstämmen, niedrigen gannen u 6 m | | | 709 710 | violacea, biolet | 4 | 1 |
| 645 | Strauch bon 3-34 Tuy hohe Gr Brachte feine | | 3 | | Blattpflange. Der Stamm Dient zur Unter- | | |
| | fconen Bluthen, welche benen ber Malope grandi- flora abnlich find, im falten Saufe mabrend bes | | | 711 | lage bei Beredelung ber Bernulen glutinosa. TF. Eden. 7-8 Bb. bobe Gruppen- | 6 | 1 |
| 646 | Winters crispa, OF. 3-9 &f. Zierpflanze mit am Rante | | - | 712 | und Einzelpflange | 6 | 1 |
| | wenen bluitg traujen Blattern | 2 | 1 | | Deforationspflanze mit schonen tiefrothen Blumen | 4 | 1 |
| 647 | " lateritia. Neu. Rriechende niedliche perennirende Species für Felspartieen, Topfe und Umpeln. | 1 | | 713 | Nierembergia gracilis, (calveina, filicantis,) hore | 4 | 1 |
| 648 | " miniata, hochroth. 21 TF 2 Kuf | | 1 | 714 | Nigella damascena fl. pl., gefüllter uledriger Garten- | | 4 |
| 649 | Martynia lutea. OTF. Brachtig golbgelb, roth punf- tirt und geftreift . | 6 | 1 | 715 | Nigella damascena fl. pl., gefülter niedriger Garten- Schwarzfümmel. O F., hispanica, 1 Fg., großblum., schön blau | 3 4 | 1 |
| 650 | " proboscidea, Glephantenruffel, Bemshorn. Gehr | 0 | 1 | 716 | atropurpurea.* Neu. Nebertrifft alle bis iekt ful- | 4 | 1 |
| 651 652 | matricaria capensis fl. pl., 40F. | 6 | 1 | | tivirten Urten und Barietaten diefes Genus burch die Größe und Schönheit bertiefblauen | 100 | |
| 653 654 | Darcievalla, Dipielpinii, S.I.(*) F. | . 15 | 1 2 | 718 | nnd dunkelpurpur gefronten Blumen | 8 | 1 |
| 655 | " alba, rein weiß Laceyana, rothblühend Burpurroth, großol, fein | | 4 2½ | - 1 | und derfeiben Kultur der geschätten N. | . 1 | |
| 666 | with white depoted in oan promincultan | | 3 | | atropur. Diefe neuefte Barietat bat noch ben Borgug, zwei Monate früher zu bluben, | | |
| | Schlingpflangen, melde fich vorguglich gur Beflet- bung von Rofenftammen und zierlichem Gitter- | 1 10 | ш | 719 | Nolana atriplicifolia." OTF. Rieberliegend, prachtig | | 3 |
| 667 | Mesembryanthonym countrilling (6:24) Comp | | | | Nycterinia capen is 24 O T. Rerhreitet Mhands | 3 | 1 |
| 000 | a tricolor, Tienr intention | | 1 | 721 | ben költlichiten Banillegeruch | | 21/2 |
| 000 | Intereffant megen ihrer Gigentbumlichfeit, Die | 0 | 1 | 722 723 | Ocymum Basilicum bullatum. OTF. Allgemein beliebt | . 1 | 2 |
| 0.00 | Ju fenten. | | | | meden bed Wichlartuchd teiner Blatter | 75 | 1 |
| | Mimulus cardinalis icarlachrothe Gauflerbl. 4 OTF. Prachtig unancirt | | 1 | 725 | Oenothera acaulis. 4. TF. Mit großen meißen Almnen 1, bistorta, Veitchians. O TF. 4 88, gelb init | .0 | 2 |
| 671 | " hybridus tigrinus * in ben prachtvollften Raan- cen, bon niedrigem, gedrungenen Wuchfe | | | 726 | | | 1 |
| 672 673 | " cupreus, & Th. boch, glangend, fupfericarlachroth | | 3 | 727 728 | coccinea. 1 \$\frac{1}{2}\$, prādītā brdītoja Drummondii. \$\sigma \color{1}\$ \tag{1}\$, \$\frac{1}{2}\$ \tag{1}\$ \tag{1}\$. Lamarckii. \$\sigma \color{1}\$ \tag{1}\$ \tag{1}\$, \$\tag{1}\$ \tag{1}\$ \tag{1}\$, \$\tag{1}\$ \tag{1}\$ \tag{1}\$, \$\tag{1}\$ \tag{1}\$ \tag{1}\$. missouriensis (marroagna). \$\tag{1}\$ \tag{1}\$ \tag{2}\$, \$\tag{1}\$ \tag{2}\$. | . 10 | 15 |
| 674 | , moschatus * bifambuftenb. Befannte und ihred | 3 | | 729 | " Lamarckii. 6 Fr. 3 Bf., überand reichbin- | | 1 |
| 675 676 | Duftes wegen beliebte Pflanze , quinquevulnerus * in pracht. Barietäten | 1 | | 730 | " missouriensis (macrocarpa). 4FT. 1 F., sehr | 1000 | |
| 010 | Die vor einigen Jahren in den Sandel gekom- menn prachtigen Barietaten von M. pardinus er- | | 1 | 731 732 | Urobus lathyroides, 21 F: Gehr reichhlühend hier | 6 | 2 1 |
| | ideinen bier jest alle mit boppelter Mune und | | | | Oxalis rosen, rojentother Sauerflee. "TF. 1 FB. | | 2 |
| 0.0 | jdeinen hier jest alle mit boppelter Blume und geichnen fich burch viel langere Michtenbauer aus. Kommen konftant aus Camen. 100 Korn 5 Gar. | | 1 | 734 | tropacoloides. *O F. Niederliegend Die rath | | |
| 681 | Rommen konftant aus Samen. 100 Korn 5 Sgr. Mirabilis Jalappa, 4 OTF. 10 Farben. Bete a Ltb. 4 Sgr., a Br. 1 Sgr. | | | | Effett hervor | 1 | 1½ |
| 682 683 | | | | | Paeonia sineusis (edulis, albift.), chines. Bacnie. 4 F. | | |
| 684 | , longiflora, langblüthig, violet | 1 | 1 | 38 I | apaver bracteatum, 21 F. 2-3 Sti. leuchtenh hunfel. | 100 | |
| V | Momordica, fiehe Cucurbitaceen Seite 9. | | | 39 | n Blurselli n. Dl. (*) F. Z will defull mein heachta | 1/2 1 | |
| | | | | 1 | roth gesprenkelt | 1 | |

| 18 \(\subseteq \text{Soth} \) \(\partial \text{Fr.} \) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|------------|--|----------|------|--|--|--|--|--|
| m- 1 | | Loth | Pr. Sgr. | No | - Sg | | 5gr. | | | | | |
| Ra | Papaver Murselli | Sgr. | 1 | 796 | Polygonum orientale pumilum, niedrig | 1 | 1 | | | | | |
| 740 | " " fl. lilacino pl. Ger. ma, toto gestemet. | | | 797 | Polygonum orientale pumilum, niedrig Portulaca alba, rein weißer Portulact.* OFT. aurea, goldgelb striata, goldgelb gestreist """ """ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | | 1 | | | | | |
| 741 | partireno Ranunfelmobn in vielen | 4 | 1 | 798 799 | " striata, goldgelb gestreift | | 1 | | | | | |
| 742 | Rhoeas ft. pl., getutet schauter gebermohn in somniferum ft. pl., ertra gefüllter Febermohn in | 4 | 1 | 800 801 | "Gillesii, carmoifinroib | 2 | 1 | | | | | |
| 743 | 10 Bradligen Stiten, | 3 | 1 | 802 803 | Melange ber besten Sorten . 1: Melange ber besten Sorten grandistora fl. pl. TF. gef. Bortulatroschen. grandistora fl. pl. Stripe gefort in ben ichabbariten Be- | | | | | | | |
| | jede Gorte . Dieselben gemischt | 2 | 1 | 000 | Dieje Budiung genten Briffantes, glubendes | | | | | | | |
| 743a 744 | The activities Mannienillon in 10 Dillutillen | 4 | 1 | | Scharlachtoto, gelb und ibete fent 75% gefüllte. | | | | | | | |
| 745 | orten, jede Diefelben gemischt weiß mit kupfer- | 24 | 1 | | Felgende Farben eribtelen fich atbetten, jede | | | | | | | |
| 746 | get. Iwerg · pabitetitteling it in ger | 6 8 | 1 2 | | 1. alba, 1. spiendens, 5. 1086a, 4 100 Korn 2 Ggr. | | | | | | | |
| 747 | n gef. Zwerg Kaontentioon, wer mit taffer foarlach, neu und prachtig. Passiflora coerulea § A. T. Bet. fcone Schlingpflange Pectis angustiolia. OF T | | 5 | 1 | 5. aurea, 6. caryophylloides, jede Farbe à 50 Rorn 3 Ggr. | | | | | | | |
| 748 | Die gent 3 4 20ff hohe Bflanze entwidelt eine | | | 803a | | | | | | | | |
| | Unrahl iconer, lebbaft gelber Blutheutopichen. Die Blatter besitzen gerieben einen starten Drangebuft. | | | 1 | Die Port. bluben am icouften in magerem Bo- | | | | | | | |
| 749 | | | | | den und der vollen Sonne anogejegt. | 1 | 1 | | | | | |
| | Bartetat, wird 1-19, 3. bold, itte tangen per blaulich | | 5 | 804 805 | Potentilla alba. 4 2 & 2 F. | 6 | 1 | | | | | |
| 850 | purpurnen Blüthen. Neu barbatus Torreyi (Gray). Diese Blanze ist merk- würbig wegen ihred frästigen Buches, wird würbig wegen ihred kräftigen Granlad. Neu | | 5 | 806 | formosa, icon, bunteltoja, gentett | | 1 2 | | | | | |
| 750 | | | 5 | 807 808 | "hybrida, Melange prachtiger Street. Bracht- | | | | | | | |
| 751 | " digitalis. 4 F. 2-3 vB., werb nie Gection | | 1 | 809 | forten I. Ranges | | 6 | | | | | |
| 752 | glaber (Pursh). Men. Det bitate ich ich ine Species. | | 101 | 811 | | | 4 | | | | | |
| | Die Plumen sind meist schon blau, der Schund schon lifa. Die Pstanze selbst ist volkommen hart foon blau. | | 5 | 813 814 | alba rubra striata, totogettetti cupreata, funfer-carminroth. | | 6 | | | | | |
| 753 | grandiflorus. 4 TF. 3-4 3., ote feet Broke | | 4 | 815 | erecta fimbriata albo-violascens (benaty). | | 1 | | | | | |
| 754 | | | 2 | | bluben rein weiß, im ibetteten Dingen 6 Ggr. | | | | | | | |
| 755 756 | pubescens, 13,—2 &, platt. pupul, tetapen, 2 Wrightii. 14,—2 &, bunfelrosa mit weiß | n | 1 | 816 | | | H | | | | | |
| | neneften beigifchen and engaffer | | 6 | 817 | 7 , fimbriata, gewinvert größblumig roth 50 Korn 3 Sgr. 20 , alba, gew. weiß 50 Korn 3 Sgr. | | П | | | | | |
| 757 | gejanmett Fancy, reichblübend. Odier, prachtvoll fünffledig | | 6 3 | 818 | | | | | | | | |
| 758 759 | zonale, Scharlach. B. in fublien garben. | | 1 | 820 | striata, gestreuft | | | | | | | |
| 760 | rothen Blattelli, ausgestignet für | . 4 | 1 1 | 82 | groeta superba, gew., großbl., aufrecht. | | 1 | | | | | |
| 761 | Petunia hybrida. 2011. Su gauges gesam. | | 1/2 2 | 82 | 50 Rorn 7% Sar. | | | | | | | |
| 762 763 | " Countess of Ellesmere, dunkefrosa mit weißer Schlund, eignet sich vorzüglich zur Bette | | | 82 | 3 " macropuffa geichnet fich burch traftige, lange Blatter aus, welche ber Bflange einen ben alteren Blatter aus, melde ber Bflange einen ben alteren | | | | | | | |
| | dung von Rübeln 2c. | n · | 1 2 | | | | | | | | | |
| 765 | bung von Kubeln 2c. inimitable, großblumige mit gestedten Blume fleinblumige, mit gestedten Blumen . | | 2 | | feblenoen, geformten Blumen find gefrangt, intensiv Ben, icon geformten Blumen find gefrangt, intensiv purpur-carmin mit großem, funffledigen, lebhaft | 133 | | | | | | |
| 766 767 | kermesina grandinora, gropotating | | . 4 | | gelben Auge. 1 Suß boch, dunkelrofa. *24 F | 100 | 3 | | | | | |
| 768 | " " marginata, grobbl. grungerand. Sattetuten . | | 4 | 82 | | | 2 | | | | | |
| 769 770 | | | 3 1 | 82 | farinosa Duchesse de Brabant | | 2 | | | | | |
| 771 772 | tanacetifolia, rainfarnblattrig. Phalacraea coelestina. LOTF. 3 H. schön. | | 8 1 | | | | | | | | | |
| 773 | Phlox decussata, page percuateur | and have | 2 | 3/2 | blume erften Ranges. all eine glochfullte Blumen in | | | | | | | |
| | Den unjetem Prummond's Flammenblume. OT | F. | 8 . | 12 | ben brillantesten garben betingen, betigen. Muger- | | | | | | | |
| 774 | Biele Farven gemiligt | - | . 3 | 1½ | bem besteht ein besonderei Botgag biefet bitage | 1 | | | | | | |
| 775 | oculata, weiß mit rothitchem auge | | . : | 2 | beigeften, trodensten Wetters bone aufbeten amge | 1 | | | | | | |
| 777 | atropurpurea, bunteipurputtetige stunteen | OU N | | | 29 Reseda odorata, wohlried. Rejeda OF. Bfb. 25 Sgr 30 grandiflora, großblumig. Robufter als die gewöhnt. | (. l | 1/2 | | | | | |
| 779 | " " coccinea, rein feuerfattett. | | | 3 8 | 30 "grandiflora, grobolumig. Bobufteltur geeignet. R. und besonders gur Copffultur geeignet. Pfb. 25 Sgr. | | 13 | | | | | |
| 78 78 | 1 sabellina. Mein geibe Buttetaten . | | | 2 | and the same of th | | 1 | | | | | |
| 78 | 3 Princesse Royal, Illa, mein gestreift | | | | " maculata, gestett. Stumen groß, tolubartat | | 1 | | | | | |
| 78 78 | Wilhelm I., pradition butter 15, 12 F. 2 | Bon | | | farbenen Ring unigeven ist | | | | | | | |
| 78 | grachtforten gefaumelt . Phygelius capensis. hOTF. 2-3 F., scharlacht | oth | | 8 | Manglesii | | | | | | | |
| 78 | practity . OTE felten | | : | 11/2 8 | Rhododendron arboreum hybridum. 21. Superior | e | . 1 | | | | | |
| 78 78 | Podolepis auriculata. OTF., felten gracilis, 2–3 Suß hoch, rosa und weiß | -10 | | 14 | Greentianes behridum brf. Borgugliche Corter | n | | | | | | |
| 79 | 10 n. albo, tell totte Schone Emmorte | elle, | 8 | | gentilot. Hatt wie pontente | . 1 | 21/2 | | | | | |
| 79 | 12 0., William Links on hed Cherrit | aut. | | - | 338 Jenkinsi D.T. Gine prachtb. Spettes ben Bushan | 1, | 1 | | | | | |
| 79 | | | 2 | 1 1 | herrlich buftenben Blimen | | . 8 | | | | | |
| | n. albo, weiß br. Burburroth geabert Polygala myrtisolia. br. Polygonum orientale. OF. 4-5 guß hohe ich | öne | | | Baum. OTFW. Reue Barietat mit rofafar benem Stengel | 71.15.41 | 7% 3 | | | | | |
| | 95 Polygonum orientale. Or. 22 october 195 | | 3 | 1 | peneme Stenger | | | | | | | |

| | | | | 19 | **** | | | |
|------------|--|------|---------|------------|------|--|--------------------|------------|
| R | | Bot | | r. | | | 2oth | 97 |
| 840 | Ricinus borboniensis arboreus | Sgr. | - | | 385 | Statica cinucia (x" | Sgr | Pr. |
| 84 | bentliche Gröbe. Erreicht eine außeror. | 3 | | 8 | 386 | Statice sinuata, jobn blau | 6 | 1 |
| 842 | Sabbatia campestris. o'TFO. Eine reizende Gen- tianee, großblumig, icon hochrofa, im Schlunde | | - | 8 | 888 | Stenactis speciosa, 4 OFT. Stevia Eupatoria, 4 TF. | 6 | 1 |
| 843 | | | 5 | | 889 | " Parpurea, purpurroth. 13-2 BB. Coon für ben | 15 | 15 |
| | blumige Brachtiorten melirt | 10 | 1 | | 90 | Tagetes erecta fl. pl., gefüllte Sammethlume. OTF. 2-24 Fuß boch, in mannigfachen Nüancirungen. Bor dunft. Gebölungricen pon jehr generalen. | • | 15 |
| 844 845 | Salvia argentea, silberweiße Salvie 14-2 Sub | 12½ | 1 2 | | 91 | Bor dunft. Gehölzpartien von febr gutem Effett | 5 | 1 |
| | haarige Burgelblatter fich auterft northeilhaft nom | | | | 92 | Bouquetblume | . 1 | 1 |
| 846 | , coccinea, icarladr. 2-3 Sub h hork | | 2 | 89 | 93 | signata pumila. *OTE 1 305 | 4 | 1 |
| 847 | , punicea nana, granatroth. G., 1/2 Bus boch, febr | | | 894 | 4a | , fl. pl., gefüllt, febr niedlich | 4 | 1 |
| 848 549 | Roemeriaua, OTF. 1-2 Fuß, carmoifinroth. | | 1 | 89 | | Thunbergia alata, &b OTF w. Cholbook wit is war | 5 | 1 |
| 030 | Roemeriaus, OTF. 1—2 Suß, carmoifinroth. Sanvitalia procumbens. "OFT. Allgemein beliebt zu Einfassungen z.c., goldzelb mit schwarzrother Schebe, den agnen Compuner hindrych 666cab. | | | 89 | 97 | braunem Grunde | | 1½ 1½ |
| 850 | procumbens fl pl. | 8 | 1 3 | 89 | 98 | n n adiantiaca, leuchtend prange mit ichmarinia- | | 1,5 |
| | Blumen von bichtefter Gullung. Die Sanv. eignen fich vorzuglich fur ber | | | 89 90 | | lettem Grunde | | 1% |
| 851 | Saponaria multiflora, *OFT 1 Suf lebbaft rofen- | | | 90 | | und goldgelb | | 1 |
| 852 | roth, reich und lange blübend . multiflora alba, neu und schön . | 4 | 1 | | | curbitaces SUTE | | - |
| 853 854 | marginata, ueu, fleischfarben . Scabiosa aropurpurea, jowarzpurpurrothe Scabiofe | 3 | 1 | 90 | | Trychosanthes, siehe Cucurhitacean Seite | | 1 |
| 855 | | 5 | 1 | 90 | 4 | Tropaeolum canariense (peregrinum). § FT. Sochrankend, icon belaubt und fehr reich blubend | | 0 |
| 856 | " atropurpurea nana, niedrig, 2 Fuß. Brächtige Rünneen gemischt | 5 | 1 | 90 | 5 | " Lobbianum. § boTF. Debrere icone Farben | 111 | 4 |
| 000 | " " fl. pl. Diese schone Reubeit ist eine bedeutende Berbefferung der befannten Scabiosa nana, mit | | | 906 | | " Brillant, brennend icarlach, großblumia | | 2 1½ |
| | röhrten Pompon-Chrysanthemum, Der Mucha | | | 908 | | rothen Gleden | | 2 |
| 857 | Schizanthus Grahamii Grahamis Graftellung One | | 25 | 909 | 9 | " Kotschianum multiflorum, icharlach fleinhlum | | 15 |
| 858 | grandiflorus oculatus. Briffant hurburroth | 10 | 1 | 1 310 | | bedt fich mit Blutben, die burch ibre brif- | | |
| 859 | " albus. Ein Samling von grandft. oculatus. Große weiße Blumen mit ichwefelgelbem Auge | 0 | | 044 | | 15 Rorn 5 Sor | | |
| 860 | , atropurpureus. Reu. Gin anderer Camling bon grandfl. coulatus. Große, icone reich pur | | 1 | 911 912 | | " Lili Smith, hellscharlach | | 2 |
| 861 | retusus carminrate ville mit ichmargem Huge . | | 1½ | 913 | 3 | Binnoberroth icatirt | . 1 | 25 |
| 862 863 | , retusus, carminroth mit goldgelb und purpur . , , fl. albo, weißbuß, | 8 | 1 | 914 | | rothen Fleden . majus, große Capuginerfreffe. § DTF. | 2 | 3 |
| 864 | 1½-2 F. h., weiß, wohlriechend. OTF. | | 1 | 915 916 | | " Eduard Otto, ilia mit Atlasglang. " Regelianum, prächtig purpurviolet. | | 1 |
| | Scyphanthus elegans, Laffenblume. § Tw. Windend 4-5 guß boch. Die fcon gelben Blumen in- | | | 917 | | " Scheuermannii coccinea, ftrohgelb, hellicarlach geftreift und marmorirt | | 1 |
| 865 866 | Sedum Aizoon, sching 24 F. soeruleum. OTF. 4-6 30ll, reichblüßend. Eins ber schingt fram b | : | 2½ 1 | 918 | | minus Tom Thumb. Crystal Palace Gem. hoTF. Strobgelb, roth und braun marmorirt | | 1 |
| 000 | ber ichonften Sommergewächse für Einfaffungen, | | 0 | 919 920 | | " " " Deauty, gelb, imarlam getlammt | | 1 |
| 867 | " spurium. 24 F. Kriechend, burburroth | | 1 1 | 921 | | " " elegans, leuchtend carmoifin | | 2 |
| | Abbange geeignet | | | 922 | | bunfler Belaubung | . 2 | 2 |
| 868 | Senecio elegans fl. pl., gefülltes Rreugfraut OFT. | | | 923 | | a atrococoineum, dunkelscharlach | | 135 235 |
| | 1. weiß 2. Illafarbig 5. dunkelpurpurroth | | | | | tantend, fondern bilden niedrige fompacte | | |
| | 3. violetroth 5. afchbraun Sebe Farbe à Br. 11/2 Sgr. | | | | | pfehlen, welche feine Saufer zur liebermin- | | |
| 869 870 | Biele garben gemifcht 1/s Eth. 4 Sgr. Senecio elegans nann fl. pl., gefülltes niedriges Rreng- | | | | | terung von Scarlet Pelargonien haben. Die Formen von T. Lobbianum und | - 1 | |
| | 1 mais | | | | | majus eignen sich auch vorzüglich zur Lopfkultur, indem sie im temperirten Hause | | |
| | 2. tief rosa 5. purpurroth | | - | 924 | V | en gangen Winter blüben. | | |
| 671 | 3. carminroth 6. violet Sede Farbe à Br. 21/6 Sgr. | | | 925 926 | | Drummondii OTE 11/2 | 1 | |
| 672 | Sebe garbe à Br. 28 Sgr. Biele Farben gemischt 1/2, Lth. 6 Sgr. Silene Armeria, Morgenröschen. O F. 1—2 Hh., leuch- tenb roth | | | 927 | | " you da . y () I F. 250n neuen arabh lumiaen Rarie. | 1 | |
| 673 674 | A alba waita | | 1 1 | 928 929 | V | taten gesammett | 5 | |
| 675 676 | Atocion, gedrängtwiichsig, 1/2-1 Fuß, schön | | 1 1 | 930 931 | Vi | icia Gerardii, § . F. Reu. 4—5 F., prächtig violet 5 | 1 | |
| 877 | , fl. albo, weißblübend | % | 1 1 | 932 | | iola odorata semperstorens, A.F , truching biblet 8 , tricolor maxima, O. F.T. Biele Farben gemischt, nur von prächtigen Blumen gesammelt | 13 | ś |
| 978 979 | Solanum Capsicastrum, Beifibeer-Nachtschatten bre | | i | 933 | , | nur von prachtigen Blumen gesammelt 3 | 25 | 4 |
| | farbigen Grüchten mit gablreichen, icharlach-orange | | 2 | 934 | | , , auritelfarbene | 2 | |
| | OTEW 2 Cufaffergurfenbl. Nachtschatten. | | | 936 | | marmorata, prachtic marmorist | 2 | 4 |
| 83 | Melongena, Cierfrucht in mehreren Jarben | 1 | | 938 | 7 | , , btol. mit weißem Rand | 2½ 2½ 3 2 | 2 |
| 84 4 | benb. 4 F | 2 | | 940 941 | | scaria cardinalis. *24 FT. Neu. Bon gukeror: | 2 | |
| | Johnson, Beir 401F | 1 | | 1 | | bentlichem brillanten Magentaroth (neue Garbe | | |
| | | | | | | 2 | | |

| | 20 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|--------------|---|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 17- | | Loth | | Ma | | | Sgr. | | | | | | |
| No | Vicennia | 8gr. | Sgr. | 998 | Sorghum glycichilum, dinefifche Buderhirfe. OFT. | 4 | | | | | | | |
| | Viscaria bei ben Viscarien). Die schönen hellgrunen Blätter kontraftiren effektwoll mit ben zahlreichen | | | | 4—5 guß pou | î | | | | | | | |
| | Blumen | 15 | 2 | 999 1000 | Ctime elegantissima. A FT. 3 Mus 4044 | 0 | 6 | | | | | | |
| 942 | oculata, Lichtröschen. 4—2 gus pru | | 1 2 | 1001 | gigantea, 4 Buß boch ; gigantea, 4 Buß boch ; bebr beliebt wegen ; pennata, Jebergrad. 3 FB. b. Gehr beliebt wegen | | 1 | | | | | | |
| 943 944 | Wahlenbergia grandinora. 401. | : | 3 | 1002 | jeiner feberarigen, jugungen Granfannch 21 TF. | | 1 | | | | | | |
| 945 | a loa | | 1 | 1003 1004 | Tricholaena rosea, rojentotter gauttelling. 40 truniola latifolia, Spitgaras. 4 FT. 11-2 guß b Zea Caragua, Niesen-Mais. OFT. 12-15 guß boch . | 1 | 1 | | | | | | |
| 946 | Waitzia acuminata, OTF. Suphe, 1-17 out 424 | | 3 | 1005 | Zea Caragua, Riejens Matt. 12. 12. 12. 12. Cuzko, ber bochte und größte Mais für Defora- | | 11 | | | | | | |
| 947 | Smmortelle Steeziana (Wenbland). *Neu. Gine febr intereffante Species fur Miniaturtopfe; wird ungefahr 6" | | | 1006 | mund and engruen fait 3/4 Boll langen Kornern | | | | | | | | |
| 1 | hoch, mit einer Doldentraube von gelben Blu- | | 3 | 1007 | 4 Korn 5 Sgr. | 10 | 5 | | | | | | |
| 010 | men, beren jebe 15" Durignteffer febr elegante | | | | japonica fol. variegatis. Eine prachtvolle Neu- beit, welche nirgends fehlen follte. Diefer Mais | | - 4 | | | | | | |
| 948 | Bilange ben gitter wein meiber gart bellblan | | | | heit, welche nirgends febren but, die Blätter find erreicht eine Sobe von 4—5 Buß, die Blätter find 2—3 Zoll breit und ca. 4 H. lang, schon gleichmäßig | | | | | | | | |
| | flora mit einer Menge rein weißer, gart bellblan geränderter, ben Gloxinien abnlichen Blumen | 4 | 3 | | gestreift und bandirt | 3 | 1 | | | | | | |
| 949 | | | 1 | 11 | | 1 | | | | | | | |
| 950 951 | grandinora, GF. 15 Sup gest, alba, weiß. Wigandia caracasana. bTF. Gine ber effeftwollften | | 1½ | | Gehölz-Samen. | | | | | | | | |
| | Blattpilangen and albo pl meikaefulltblus | 1 | 1 | | | | und | | | | | | |
| 952 | bend. OF 1. 2-3 Bur Die bichtgefüllten | 4 | 1 | | 1. Fruchtgehölz-Camen. | Tit | 500 | | | | | | |
| 953 | Blumen find nelfenartig, rofa, roth und purpur | | 1 | 1008 | Onderie vulgarie Onittentern | 2 | 10 | | | | | | |
| | gestreift, gestrichett, gestrichet aus phylloides | 1 | 1 4 | 1009 | Juglans regia, Wallnuß | 1 | 25 | | | | | | |
| | der Fall ist. Baritt noth. | 6 | 1 | 1010 | Morus alba, weiße Manibeere à Lib. 3½ Sgr. "Morettiana à 3½ Sgr. Cedrona à 5 L'hou Prunus Cerasus, P. Avium, Kirjofiteine, jüße und jaure | | | | | | | | |
| 954 955 | Zinnia elegans, OFT. 3 8f. hoch, prachtige Müancer | 3 | 1 | 1012 | "Cedrona | | | | | | | | |
| 956 | 11. aloo, ibeth | | 1 | 1014 | L'hou Avium, Ririchfteine, juge und faure | | 5 2 | | | | | | |
| 957 958 | " " laureo, goingero | | 1 | 1015 | Piruns Cerasus, A Athun ensteine . A Ctr. 6 Thir. domestica, Pflaumensteine A Ctr. 6 Thir. Pirus communis, Birufern | 1 | | | | | | | |
| 959 960 | il. sulphureo, idmefelgelb. | 10 | 1 | 1017 | | | 20 | | | | | | |
| 961 | fl. pleno, gefullt in prachitigen Batten | | 2 2 | 1010 | | | | | | | | | |
| 962 963 | coccinea il. pi., geliute itattituroth | | 2 | 1 | 2. Ziergehölz-Samen. | | | | | | | | |
| 964 965 | violacea fl. pl., gef. violet | | 2 | | - or and some matche befanntlich ihre Reimfraft | | | | | | | | |
| 0.00 | Biergräfer. | | 100 | | Die Gehotzianten, weiche vertanten bertieren, ichneller als die meisten anderen Samen verlieren, bitten wir bis spatestens Ende Marz aufzugeben, bitten wir bis spatesten Ende Marz aufzugeben, | | | | | | | | |
| | onm 1 2 % had idin. | | 1 | 1 | La une Stole Rott alle nom potibulivenen Sections | | | | | | | | |
| 966 967 | Agrostis nebulosa. OFT. 1-2 H. hod, pulchella, stertiches 1-1 H. hod, pulchella, stertiches 1-1 H. hod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, bod, b | | . 1 | 1 | unserer Gartnerei ausgefaet werden. | 1 | Our | | | | | | |
| 968 | pulchella, gieriches H-1 88. 9009. Andropogon Sorghum. OFT. 4-5 88. hohe schon | . 6 | 3 1 | 1 | a. Coniferen. | 43 t I | . Lett Su | | | | | | |
| 969 | Andropogon Sotgann. Blattpflanze Anthoxanthum gracile, zierliches Ruchgras. Ob | . 4 | 1 | 1 | a dapfen 2 Sgr | | | | | | | | |
| 970 | 1 Hug hoch . 3ittergras. OF. 2 Ff. hoch Briza maxima, größtes Zittergras. | | 5 1 | 101 | | . (| 5 | | | | | | |
| 971 972 | minima, tlemites S. Ditterafrechen OFT. 25 %. | 6. 1 | 6 1 | 102 102 | | r. | 4 | | | | | | |
| 973 | Bromus bitzacionino | . : | 3 1 | 102 | 2 Lobbii Hort. | . 1 | 1 | | | | | | |
| 974 | queigino 1 %6 hoch. * TF | | $\begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ | 102 102 | | r | 13 | | | | | | |
| 975 976 | Submutica, 12 2 00 2 2 0 2 | Г. | 6 1 | | Lawsoniana Murr. | | 5 | | | | | | |
| 977 | Coix Lacrimae, Siobsthraue. OFT. 2 Sus hech | | . 3 | 105 | Juniperus communis, L à Bort. 24 Gar. | | 10 | | | | | | |
| 978 979 | Paramatta. 4 OFT. 5 5115 4000 Met and | n= | 5 1 | 102 | 9 Saoina D. (and Muerifa importint) | . 25 | | | | | | | |
| 980 | summahriged Grenzgras. (.) P | | 4 1 | 103 | | . 10 | 1 | | | | | | |
| 98 | Eleusine coracana, truntandella. Elymus caput medusae, Medusenhaupt. 4.0F | | 5 1 | 10: | 32 , alba Ait. | . 15 | | | | | | | |
| 98 | Elymus caput medusas, Artalianas (2 & 18 & 18 & 18 & 18 & 18 & 18 & 18 & 1 | er | 4 | 103 | balsamea L | 90 gr | 1.5 | | | | | | |
| 98 | emplediensiber delien Dies | | | 103 | oc Combra L | . 10 | | | | | | | |
| 98 | Erianthus Ravennae. + 11. | | | 2 10 | 37 Larix L | | | | | | | | |
| 98 | 5 Festuca altissima. 4 OF. Soll bis 12 88. h. werd | ett | | 1 10 | 38 "Nordmanniana Stev à Bort. 6 © | gr. | 1 | | | | | | |
| 98 | Gynerium argenteum an Sophyett gettig Festuca altissima. 4 F. Soll bis 12 F. b. wetb glauca, F. 2 Sub boch viridis. 4 F. Sebr fein und zu Einfassung "viridis. 4 F. Sebr fein und zu Einfassung | en | 6 | 1 10 1 10 | Nordmanniana Stev à Bort. 6 & orientalis L | r. 5 | | | | | | | |
| 98 | belonders gerig. Olambadarad Ol TE Gine | rer | | 10 | 42 " Finsapo Estas | 70 | | | | | | | |
| 98 | 8 Gynerium argenteum, Samplogitos. Die 4-6 Fb. bof größten Bierden ber Garten. Die 4-6 Fb. bof | en | | 3 10 | 44 Salisburia adiantifolia Sm | gr. | 11 | | | | | | |
| 98 | größten Zierben ber Gatten. Der Von Beb. Alehi Stengel tragen prächtige silberglangenbe Alehi Hordeum jubatum. Gehr effectvolle Grasart. Old Hordeum jubatum gegen Zammetaras. O F. | F. | | 1 1 10 | mandium sampervirens Endl. (Sequoia) à Bort. 5 G | 3r. 4: | 5 | | | | | | |
| 99 | Hordeum jubatum. Styl fficting Gammetgras. F. Lagurus ovatus, eiformiges Gammetgras. F. Molinia coerulea fol. var. 4 FT. 2 Hus boch | | | 1 10 | distichum, Kich. | . 40 |) | | | | | | |
| 99 | 2 Panicum orycinum. 4 1 F w. 2-3 out, 1000 | | | 2 10 | Taxus baccata L | ır. | 01 | | | | | | |
| 99 | n pileatuni, lajon Geriton hem Curculigo abulid | ilec | | | pendula Hort | 40 | 0 | | | | | | |
| | Blattern, jest betolutte | ien | | 10 | Thinja gigantea Mut. occidentalis L. orientalis L. orientalis L. var. aurea (Th. aurea) 25 Rorn 5 egi | . 40 | | | | | | | |
| | Standort und Feuchtigkeit. | | | 1 10 | | | 1 | | | | | | |
| | Stanbort und Feuchtistett. Paspalum elegans, zierlich. 4 TFW. Pennisetum longistylum. 5 TF. Setaria macrochaeta. 5 TF. 2 Ff. h., jchöne Grupp | ene | | | 055 Wellingtonia gigantea, Linui. | | | | | | | | |
| | Setaria macrochaeta. OTF. 288.9., Indicate Stupp | | 3 | 1 | 1925 - 1935 | | 1 | | | | | | |
| | h 1000000 | | | | | | | | | | | | |

| | | | 14 | 1 | | | |
|--------------|---|---------|----------|---------------------|--|--------|--------|
| No | | Pfb. | Leth. |) Ra | The second secon | 1 23 6 | b Ltb. |
| | h Mana was falland late with | Sgr. | Sgs | - | | Sa | Sac |
| | b. Neue und seltene japanische | | | 1114 | Cytisus Laburnum L | | - |
| | Coniferen. | | | 1115 | nigricans L. | . 10 | |
| | | | | 1116 | Diospyros virginiana L. | | 5 2 |
| | (gang frifder Samen.) | | | 1117 | Liaeagnus angustifolia | | 25 |
| 1056 | Abies acicularis Maxim. 100 R. 1 Thir. 10 R. 5 Sgr. | | | 1118 | Fraxilius exceisior L. | . 2 | -/2 |
| 1057 | Dicolor Maxim. | | | 1119 | - cinerea Bosc. | 40 | 2 |
| 1058 | " Tsuga S. Z 100 " 20 Sgr. 10 " 2½" | | | 1120 | , Ornus L | . 20 | 1% |
| 1059 | ", Veitchii Lindl 100 ", 1 Thir. 10 ", 5 ", Pinus koraiensis S. Z 2 ", 8 ", | | | 1121 1122 | Gieditschia inermis L | | 3 |
| 1062 | _ n obovata | | | 1123 | , triacanthos Grtn | . 10 | 1 |
| 1063 | Retinospora pisifera S. Z. 100 , 1/3 , 25 , 3 , | | | 1124 | Gymnocladus canadensis Lam | r. | mil |
| 1064 | Sciadopitys verticillata 5 , 4 , | | | 1125 | Halesia tetraptera L. | | 75 |
| 1065 | Taxus cuspidata S. Z 100 , 2 , 5 , 8 | | | 1126 | Hibiscus syriacus L., fl. pl. | | 2 |
| | 0 100000 | | | 1127 | nex Aquitonum Walt | 15 | 1 |
| | c. Laubhölzer. | | | 1128 | , , fol. aur. varieg., goldbuntblattrig | | 3 |
| | | | | 1129 | , , fol. argent. varieg., filberbuntblattrig | | 3 |
| 1066 | Acer campestre L. platanoides L. Pseudoplatanus I | 10 | | 1130 | Indigofera Dosua Ham. Jasminum fruticans | | 8 |
| 1067 1068 | , Pseudoplatanus L. | 3 | . 1 | $\frac{1131}{1132}$ | Justinum fruticans | | 215 |
| 1069 | , Negundo L. | 3 12 | 1 | 1133 | Juglans cinerea L 25 Muffe 10 Sg | | |
| 1070 | , rubrum Lam., echt | 75 | 4 | 1134 | nigra L. 25 Nüffe 6 Si Kalmia latifolia L | | |
| 1071 | , saccharinum | 25 | 1 | 1135 | Ligustrum japonicum Thnb. | 10 | |
| 1072 | tataricum L | 45 | 2 | 1136 | " syringaeflorum | | 5 |
| 1073 | Ailantus glandulosa Desf. (Mus Franfreich bezogener | | | 1137 | Liriodendron tulipifera L. | 12 | 1 |
| | Samen) | 12 | 1 | 1138 | Magnolia grandifiora L. | | 3 |
| 1074 | Alnus glutinosa Gaert. | 6 | | 1139 | , macrophylla Mx | | |
| 1075 | , , laciniata à Bort. 7 Sgr. | | | 1140 | , Norbertiana Hort | | |
| 1076 1077 | , , quercifolia Willd à Bort. 4 Sgr. Amorpha fruticosa L. | 0.5 | 11/ | 1141 1142 | , Soulangeana Hort. Par 25 , 10 , | | |
| 1078 | Aristolochia Sipho L'Her, á Bort. 5 Ggr. | 25 | 1½ 50 | 1143 | , Yulan Desf | | |
| 1079 | Azalea pontica I. | 1 | 12 | 1144 | " umbrella Lam. (tripetala) | 10 | 3 2 |
| 1080 | Benthamia fragifera Lindl. | | 5 | 1145 | , Bealii Hort | 40 | 2 |
| 1081 | Benthamia fragifera Lindl. Berberis canadensis Willd. | 25 | | 1146 | Melia Azedarach L. | 8 | 11/ |
| 1082 | 7 | | 1 | 1147 | radiownia imperialis S. Z | 1 | 23 |
| 1083 | , vulgaris fol. atropurpureis Hort | | 8 | 1148 | Perinloca graces I. | | - |
| 1004 | Ronftant aus Samen. | | - 1 | 1149 | Philadelphus coronarius L. fl. pl. | | 6 |
| 1084 | Betula alba L | 3 | : 1 | 1150 | , Gordonanus Lindl Sort. 12 Gar. | | |
| 1085 1086 | , nigra L | | 10 | 1151 1152 | " grandiflorus Lindl | | 12 |
| 1087 | " odorata Bechst. Bignonia radicans L. | 10 | 1 8 | 1153 | Platanus occidentalis Hort. (vulgaris) Prunus Mahaleb L. | 10 | 1 |
| 1088 | Broussonetia papyrifera Vent. | . / | 4 | 1154 | " Padus L. | 15 | 1 |
| 1089 | Calycanthus praecox L. | | 5 | 1155 | Laurocerasus L. | 15 | 1 2 |
| 1090 | grandiflora | | 8 | 1156 | virginiana D. R. | 25 | 15 |
| 1091 | Caragana arborescens Lam, | | 4 | 1157 | Ptelea trifoliata L. | 25 | 1% |
| 1092 | Catalpa syringaefolia Sims | | | 1158 | | | 15 |
| 1093 | Ceanothus azureus L à Bort. 2½ Ggr. | | | 1159 | Knamnus Alaternus I. | 30 | 11/2 |
| 1094 1095 | Celtis australis L | | 15 | 1160 | Kilus Cotinus L. | | 4 |
| 1096 | " occidentalis | | 3 2 3 | 1161 1162 | , typhina L | 20 | 1 |
| 1097 | , Siliquastrum L. | | | 1163 | Ribes alpinum L | 6 | 4 |
| 1098 | , fl. albo | | | 1164 | , Bessoniana Hort., bie neue icone Rugelafagie | 0 | 40 |
| 1099 | Clematis cirrhosa L à Bort. 2 Gar. | | 12 | 1165 | " Decaisneana. Neue icon rothblubende Barietat | | 40 |
| 1100 | , Viticella L | | 3 3 | | Det gemeinen Marie 25 Korn 5 Gar | | |
| 1101 | , fl. rubro | | | 1166 | Sophora Japonica L. | 15 | 1 |
| 1102 | Colutea arborescens L | 20 | | 1101 | pendula | | 3 |
| 1103 1104 | " cruenta Ait | | | 1168 | Sorbus aucuparia L. | 6 | |
| 1104 1105 | " mascula B. et L. | 60 | | 1169 1170 | Spiraea canosa Inub. | | 5 |
| 1106 | Cotoneaster microphylla Wall. | 10 | | 1171 | " Douglasii Hook | | 6 |
| 1107 | Crataegus coccinea L. | 10 | | | Staphylea pinnata L. | 20 | 6 |
| 1108 | " Crus-galli Ait. | | | 1173 | Tilia argentea Desf. | 20 | 15 |
| 1109 | " melanocarpa β monogyna L | 25 | | 1174 | , platiphyllos Scop, (grandifolia) | 10 | 1 |
| 1110 | , Pyracantha Pers | 20 | | 1175 | vulgaris Havne, (europaea) | 8 | 1 |
| 1111 | | 20 | 1% | 1176 | viournum Lantana L | | î |
| 1112 | , capitatus Jacq | | | TILL | Vitis (Ampelopsis) hederacea Ehrh | 15 | 1 |
| 1113 | " elongatus W. et K | . 1 | 5 | 1178 | , Isabellina, | | 7½ |
| | | | | | | | |

Grasmischungen für Rasenpläte.

Indem wir nachstehend verschiedene Grassameumischungen zur Beachtung empsehlen, welche kleinere, wie größere Gärten zu zieren bestimmt sind, glauben wir nicht unterlassen zu dürsen, einige erläuternde Borte, sowohl in Bezug auf die Mischungen selbst, wie auf deren Berwendung hüuzussügen. Für durchaus günstige Berhältnisse, wie sie der meist in hoher Kultur besindliche Boden der Gärten bietet, genügt es, wenn die Bestellungen nach den gegebenen 5 Nubrisen ertheilt werden; anders verhält es sich aber, wenn etwa Umstände besonderer Art in Betracht kommen, welche der Entwicklung eines Theiles der gewöhnlich zu diesem Zwecke benutzten Gräser nicht sörderlich sind. Die Gründe hiere six werden sich meist leicht erkennen lassen und können dann, wenn wir von deuselben nur eingehend nuterrichtet werden, häusig durch eine den Berhältnissen angemessen Abänderung beseitigt werden, trägt nicht gerade übermäßige Dürre, Nässe oder Mangel an Kultur die Schuld; auch bedarf es der Erwähnung, wenn die Beschässenbeit des Bodeus, wie eine ranhe Lage das Auskwintern begünstigen sollte. Weisst kann durch Benutzung solchen Eusstlissen tachseht, welchen unsere ein leidlich dauernder Rasen erzielt werden, der wohl an Feinheit demjenigen nachseht, welchen unsere zur Zier beliebtessen Untergräser bei alleiniger Benutzung bieten, der aber doch, wenn nam nur nicht versämmt, ihn ummer kurz zu halten, seine etwas gröberen Bestandtheile wenig ausschlichen Ausorderungen der Rasen genügen soll. Ist

er bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartieen zu umgeben, und ist er namentlich so gelegen, daß der Beschauer denselber in vertikaler Richtung sieht, so muß, damit der Erdboden nicht durchscheint, die Gräser also den Boden vollständig bebecken, dicht, 3/4 bis 1 Psinto p. — Ruthe, gesäet werden. Jemehr sich die Rasenslächen von dem eigentlichen Ziergarten und dem Auge entsernen, um so mehr psiegt man dis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum zu verringern. Bei den sehr divergirenden Ausprücken, welche betress der Dichtigkeit, namentlich bei bedeutenden Ausgen an dergleichen Rasenslächen gemacht werden, wird es schwer, ein bestimmtes Minimal-Aussaatquantum sestzustellen; indessen bemerken wir doch, daß wir 50 Psb. p. Magdbg. M. sür das geringste Maß halten, will man nicht bei noch geringere Saat zuweilen ein ganzes Jahr warten, ehe die Flächen leidlich gedeckt sind.

Gine Unleitung gur Unlage und Unterhaltung eines bauernben Gartenrafens fteht unferen Abuehmern gu Dienften.

| | 100 \$10. a \$10. |
|---|-------------------|
| | Thi. Spr. Spr. |
| 1. Rafenmifdung für Parts mit gutem Boben | 156 |
| 1. Hafenmifgung für puris mit gutem Soben | 14 5 |
| 2. " " leightem Boden | 15 15 6 |
| 1. Rasenmissung für Parks nut gutem Boden "teigtem Boden 3. " beschattete Nasenslächen Hächen (in Pleasuregrounds tc.) 4. Feine Rasenmissung sur größere, gut gehaltene Flächen (in Pleasuregrounds tc.) | 19.19 6 |
| a with the same sing and there are acholtere Rioden (in Pleasuregrounds it.) | 10.100 |
| 4. Feine Rajenntigung int großere, gut geguttent Brugel (in entantremene Rajenniage) | 16.156 |
| 4. Feine Rafenmishung fur großere, gut genattene Rudgen (in Treasuregevounds te.). 5. Gartenrasen von größter Zeinheit (für kleinere durch Blumenpartieen ze. unterbrochene Rasenplage) | 10.10. |

Pflanzen von Blumen und Ziergräfern.

Bur Pflanzeit fteben Pflanzen von Levkopen, Aftern, Balfaminen und ben meiften anderen Blumen, ebenfo auch von Ziergrafern g Dienften. Der Breis normirt fic, je nach ber Seltenheit, von 3-15 Ggr. pro Schod.

Nachtrag,

die Neuheiten für das Jahr 1868 und einige andere Samen enthaltend.

| Ru | | | Brife Sgr. | | Rr- | | Lth. Sgr. | Sgr |
|------------------------------|---|----|---------------|---|------|--|--------------|-----|
| | Anastatica hierochuntica, OTF. Rose von Fericho | | . 1 | | 1202 | Centaurea (Amberboa) moschata atropur- purea. OFT. Unterfceibet fich von ber bis jest tultivirten Urt burch ftart ins Rarmin übergehenbe, | | |
| 1180 | Antirrhinum majus pumilum quadrico- lor, OFT. Gine ausgezeichnete 3wergsorte, farmoisin mit ich rtach, weiß und gelb. | | 4 | | 1203 | tief bunkelrothe Blumen. Wird febr gerühut Chrysanthemum carinatum hybridum fl. pl. | : | 10 |
| 1181 | An irrhinum multiflorum. Durch Befruchtung von A, rupestre mit A. majus entstanden. Die Blumen sind rosa mit weiß und etwas fleiner als bei A. majus, sie erscheinen so reich, daß die H guß hohe Pfianze ganz davon be- | ٠ | 10 | | | hier neue Barietaten mit großtentbeils bichtgefullten Blumen in ben verschiebenlien Schatterungen von orange, icharlach, rofa, braunroth ober purbur, welche eine icone Blerbe unferer Garten zu werben nerinreben. | | |
| 1182 | | | 3 | | 1204 | Chrysanthemum tricolor annulatum, o fehr bubiche Sorte, die orange Blumen haben einen icharlachrothen Ring im Gentrum | | 2 |
| 1184 1185 1186 | , aurora | | 3 3 | | 1205 | Cineraria hybrida var. kermesina (Benary). Fr. Rein carmoifinroth, eine constante und sehr werthvolle Bereicherung, namentlich für ben | | 10 |
| 1187 1188 1189 1190 | " " carmoisinroth | | 3 3 3 | | 1206 | Blumenmartt. Clarkla pulchella integripetala alba plena. TF. Chöne Barietat mit rein weißen, ge- füllten Blumen, bie groß und vollkommen imbri- | | 4 |
| 1191 1192 1193 | , , , geflect | | 3 3 2 | | 1207 | quirt sind. Clarkia pulchella marginata fl. pl. OFT. Sebr gefüllt mit rundem, schönen weißen Kande, ebenso brauchbar für Bouquets wie für Einfassungen | | 6 |
| 1194 | gemischt Darietäten werben nicht halb so vortebenden Barietäten werben nicht halb so hood als die alteren Formen des Ant, majus, fie find jedoch viel robufter als jene und blüben fehr reich. | | 2 | | 1208 | Collinsia verna. Diefe Art ift fehr elegant burch die frijche Farbung ihrer gergen Blumen, welche halb gart blau und halb rein weiß gefärbt find; sie ist fehr werthvoll burch ihr frühes Blühen jur Ausschmidtung des Gartens im Frühjahr, in | | |
| 1195 | Asclepias tuberosa, 4F 25 Rorn 5 Ggr. Die iconfte Species biefes Genus. Blumen leuchtend icharlachroth. | ı | | | 0.1 | Töpfen oder freiem Grunde. Die Camen nuffen febrzeitig im Fruhjahr, vortbeilhafter noch im berbite gefaet werben, follen die Bflangen fich fraftig ent- | | |
| 1196 | Begonia, Reuefte Gorten, gegenseitig befruchtet, gem. b.w. | | 5 | | 1209 | wideln | 4 | |
| 1197 | Briza compacta, . 4. aufrecht und gebrungen wachsenbe, ichone Barietat bes Bittergrases, practivoll für Bouquets und andere decorative Zwede im | | | | | Dahlia variabilis. h Georginensamen von unserem ausgezeichneten Sortimente gesammelt. 100 Rorn 5 Sgr. | | |
| 1198 | Binter . Camellia, bT. gefüllte Gorten melirt, italienische | | 10 | ٠ | 1211 | Dianthus barbatus nigricans. 4 F | r | 1 |
| 1199 | Samen 10 Rorn 5 Sgr. Campanula Medium fl. roseo pl. & F Dieje fcone Barietat unterscheibet fich von ber | 19 | 2 | | 1919 | violetten Blätter, die Blumen find glänzend dunkel- roth mit weißen Staubfaben. Dianthus dentosus, 4 F. Eine niedrige, fruh. | | |
| | beliebten Marien . Glodenblume burch die frische rein rosenrothe Farbe ihrer großen Blumen. Ge ift eine febr zu empfehlende Acquisition, um fo mehr | 3 | | | 1212 | blubende ausdauernde Freisandspecies mit gahl- reichen rofa-lifa Blumen, für Ginfaffungen fehr geeignet | r. | 1 |
| 1200 1201 | als fie sich durch Samen constant sortplangt. Campanula soldanellistora pl. 24 | | 4 4 | | 1213 | Dianthus Heddewiggi grandiflorus striatus plenus, OFT. Blumen fehr groß, dicht gefüllt | 5 | |
| | Beides reizend icone Glodenblumen, welche unauf- borlich bluben und nur 6-8 Boll hoch werben. | | | | | rein weiß, ichwach mit faumetartigen Dunkelcar moifin gestreift | | . : |

| Ro | | 211 | 6. 9 | Brife | A | No | 1 | .0. | | w10. |
|--------|---|-----|----------|-------|---------|-------------------|--|-----|----|---------------|
| 1917 | Dianthus Hoddowing History Opm of h | 89 | | gr. 3 | Cly Cly | | | 88 | | rife L Dig |
| 1214 | Dianthus Heddewiggi lilacinus. OFT. Aus- gezeichnet für Einfaffungen und fleine Gruppen; ift namentlich wegen feiner langbauernben Bluthe- | | | | | | Barietaten gesammelt | 1 | 1 | I |
| | gent fent gu empfenien. Die Blumen find rein lila- | | | | 1 | 1236 | Pentastemon Colvilli. 4 F. Aus Californien. In Der Größe bem P. Jeffreynnus abnlich, aber mit | | | |
| 1915 | farben und febr effectvoll | | 10 | | | | Durnurfarnenen halbhanaenben (Canallan 1122 alien | | | |
| 1210 | Eschscholzia crocea dentata. OFT Gine neue intereffante Barietät, die Ränder ber | | 10 | | | 1237 | gend grinnen Blättern. Bolltommen hart | ٠ | 6 | |
| | Blumenblatter find gurudgeschlagen und geferbt ober gegabnt, ein bunfler Streifen lauft bis gum | | | | | | Bflange wird 2-24 Suß boch und blüht mit in breiten | | | |
| | Mittelpunkte derfelben. Die Blumen find im Ge- genfage zu den andern Eschscholzien immer ge- | | | | | | bunkelblauen Sarbe. Bollfommen bart | | 6 | |
| | öffnet, ba fie burch ihren eigenthumlichen Bau ber- bindert werden, fich gu ichließen. | | | | | $1238 \\ 1239$ | Petunia hybrida grandiflora maculata OTE | | 3 | |
| 1216 | Eschscholzia striata crocea. OFT. Blume | | | | | | und gestedten Corten, gegenseitig befructet | | 3 | 1. |
| | orange mit citronengelben Streifen, welche fehr ichart gezeichnet find und ber Pflanze ein jehr ele- | | | | 1 | 240 | Petunia variabilis reticulata, OTF., in fol- | | | |
| 1217 | gantes Aussehen verleihen | | 10 | | | 241 | , , roja, dunkelroth genett | | 4 | |
| | 25 Korn 5 Sor. | | | | | 242 243 | rothviolet mit Atlasalang, braun genebt | | 4 | |
| 1213 | Gladiolus Gandavensis hybridus, 4 TF. Bon unferem großen Sortiment ber neuesten und | | 1 | | | 244 | und mit weißein Schlund | | 4 | |
| 1219 | schönften Sorten gesammelt 100 Kern 5 Sgr. Gloxinia hybrida grandiflora, Oh Tw. | | | | | $\frac{245}{246}$ | , , purpur, immari genegt, atlangiauzend | | 4 | 1: |
| | Schon burch den fraftigen Blatimuchs erregen diefe neuen Barietaten der Gloxinien die Aufmert- | | | | 1 | 247 248 | plautichweiß, chwarz genest, febr garte Garbe Phyllanthus spec. nova. Dh T. 25 Korn 4 Sgr. | | 4 | |
| | famfeit; die febr großen, faftgrunen Blatter legen fich fo über ben Lopf, daß fie benfelben faft ver- | | 1 | 1 | 1 | 210 | Reigenbe elegante Decorationspflange und icone | | | |
| | bullen: Darüber prangen die fehr großen Minnen | | | 10 | | | Acquifition für ben Blumentifch, blugt icon 4 bis 6 Wochen nach ber Ausfaat. Die gefiederten Blatter | | | |
| | in ben glangenoften Sarben und garteften Schatti- rungen und gemahren einen überaud prachtigen | | | | | | (wie bei Mimosa) buntelgrun gur Salfte afchgrau; von entichtebenem Effett jowohl einzeln als zwifchen | | | |
| 1220 | Unblid | | | | 1 | 249 | anderen Bflangen. Primula farinosa, 4 F., eine fehr hubiche Stande | | 2 | c |
| | Helianthus grandiflorus plenissimus. OF. | | 10 7½ | | 1 | 250 | Primula chinensis erecta alba, hT, neue Rlaffe der Brimel, wo die weißen Blumen gu einem großen | • | 2 | 0 |
| | Diese Bartetat wird 4-5 fuß boch und ift bem H. californicus sehr abnlich, unterscheidet fich aber | • | 1/2 | ľ | 1 | | aufrechtstehenden Bouquet vereinigt finb, bas über bie Blatter weit hervorragt 10 Korn 7% Sgr. | | | |
| | burch seinen eleganten und boch fraftigen Buchs. Die Blumen werden doppelt so groß als die von | | | | 1 | 251 | Frimula chinensis erecta fimbriata rosea. | | | |
| | 11. californicus und find bei vollständiger Entwicke- | | | | | | Schone gefrangte, rofenrothe Spielart, mit auf- rechten Bluthenbenquets 10 Rorn 71 Sgr. | | | |
| 1222 | Heliotropium, bw., von ben neuen und beften Ba- | | | | 12 | 252 | Primula chinensis fimbriata punctata, | | | |
| 1223 | Helleborus atrorubens hybridus, 21 F., in per- | ٠ | 3 | ٠ | 1 | | Blumen brillant icarlach - carmoffin mit weiß ge- | | | |
| 1224 | Iberis umbellata atrococcinea pana OF | 4 | 1 | | 12 | 253 254 | fl. rubro pl. 10 ger 10 ger | | | |
| 1225 | Ipomoea graudiflora alba picta carminea, foliis argenteo marmoratis. § OTF w. | | | | | | Rommen beide giemlich conftant aus Camen, welcher bei biefen gefüutblibenben Barietäten größer | | | |
| | Die herzförmigen Blatter find filberweiß mar- morirt, die Blumen weiß, glanzend carmin punftirt. | | | | 1,0 | Er | als bei ben einfachen, und bolltommen flach ift. | | | |
| 1996 | Ipomoea hederacea grandiflora atrocar- | | | | 12 | 00 | Salpiglossis hybrida pumila marginata, OTF Riedrigbleibende großblumige Spielart, dunfel- | ٠ | 4 | ٠ |
| 1520 | minea intus alba, foliis argenteo marmo- | | | | 12 | 56 | scharlad mit lila Rand. " maxima psittacina. Reue gropblumige Spielarten in brillanten Far- | | 4 | |
| | Dic breilappigen Blatter find filberweiß marmo- | | | | | - | bungen, goldgeitreift und geflectt. | Ď | | · |
| | rirt, die Blumen dunkel carmin mit großem weißen Schlunde. 2 Rorn 12 Sgr. | | | | 12 | 57 | Salvia graciliflora, OTF., niedrige reichblübende Commerpflanze mit bichten Riepen, rofalila Blumen, | | | |
| 1227 | einjährige Sorte, mit blauen, rothgeflecten Rinmen | | 4 | | | 4 | vorzuglich zu Einfassungen, in der Art wie S. Roe- | 10 | | |
| 1228 | Lupinus mutabilis roseus splendens, OF Eine der jobnsten Barietäten; nicht nur die auf- | | 2 | | 12 | 58 | Tagetes patula aurea nana n. pl., OFT. | 12 | 6 | |
| | geblühten Blumen, sondern auch bie Knodven zeigen bei ihr die ichone intensiv carmin rofenrothe Gar- | | | | 10 | *** | Reue goldgelbe 3merg = Tagetes, febr gefüllt und | | | |
| | oung, magrend bet der alten mutabilis befanntlich | | | | 12 | 60 | Tricyrtis hirta, h 10 Korn 4 Sgr. ft. nigro, h., schöner als die Species; die | | | |
| 1990 3 | die Anospen weiß find und beim weiteren Aufbluben in flaroth übergeben. | | | Н | | | vinstirt | | | |
| 1225 | Michauxia campanuloides, 2F. Brachtvolle Staube, mit großen hellblauen, fast | • | 3 | | 12 | 61 | Tropaeolum Tom Thumb. Lilli Schmidt. | | 8 | |
| 1230 I | Myosotis azorica var. coelestina. TF | | 10 | | | | belliten Scharladroth. Die übereinander gewifelten Blumenblatter geben ben Blumen ein jehr vollom- | | | |
| | Bom dem fo beliebten und allgemein verbreiteten Bergigmeinnicht ber Agoren, ericeint hier eine nene | | | | 194 | 20 1 | menes Ansiehen. Tropaeolum Tom Thumb coeruleo-roseum, | 1 | | |
| | Barfetat mit icon bellblauen, faft turfie blanen Blumen. Diefelbe ift gang conftant und, da im | | | | 120 | 34 . | OFF. Bon rola Garbe mit blau unterlegt. Da die | • | 12 | • |
| | nebrigen Bau und Sabitus der Pflange gang ber | II. | | | | | in's Blane neigende Farbe bis jest bei biefer Ab- theilung der Tropaeolen unbefannt war, so wird | | | |
| | alten Species gleichen, wird fie ebenjo wie biefe eine febr willtommene Bereicherung unferer Blu- | | | | | | diese Neuhett vielen Anklang finden. Die Pflange ift febr kompatt im Sabitus nub angerordentlich | | | |
| 1231 | mengarten sein. Semophila discoidalis nigra. OF. Die Blume, | | | | 126 | 3 7 | reichblübend. Tropaeolum pyramidalis coccineum, OTF. | | 8 | |
| | ichmare | | 10 | | | | Byramidenformiger Buche, Die Blume icharlach. | 1 | 0 | |
| | erium Oleander coccineum, hT. | | 5 | | 126 | 4 | Viburnum Tinus, ht | 1 | | |
| 1234 P | ilerembergia frutescens. hTF. | | 10 | | 100 | 0 - | Viola cornuta, 4F., eine zierliche Species, sehr hübsch für Gruppen Viscaria elegans picta, OFT. | | 5 | |
| | dierembergia frutescens. hTF. Dieje halbstranchartige Art bildet jehr elegante Bulde, welche sich vom Inni bis zu den herbst- früften mit Blumen bekeft, bisissen | | | - | 126 | 0 1 | | | 10 | • |
| | als bei N. gracilis und lebhafter gefärbt. Es ift | | | | | | carmoffin, das gegen ben rein meiben Rand bin in | | | |
| | eine febr gu empfehlende Renheit fur Gruppen und Giufaffungen. | | | 1 | | | ein helles Scharlachroth übergeht. Gehr ichen für Ginfaffungen ober als Gruppenpflange. | 1 | | |
| | | | | | | | | 10 | | |

Auszug und Supplement des Baumschulen- und Pflanzen-Katalogs.

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Unfere Baumichulen befinden fich in durchaus ungeschütter, ben Winden vollständig ausgesehter Lage, bei trodenem Boden, so daß die hier gezogenen Baume und Straucher auf jedem anderen Boden gut fortgeben und auch für die öftlich und nördlich gelegenen Länder zur Anpflanzung besonders geeignet sind. Tochstämme bevorzugen wir bei Arpfell und Birnen biejenigen Sorten, welche auf den verschiedenen deutschen Bwede (ob für die sammlungen empfohten wurden. Bei Auftragen, wo uns die Bahl überlaffen bleibt, bitten wir zu bemerten, zu welchem Zwede (ob für die Tafel, Virthschaft, ob für Sommer, herbst, ober Winterbedarf) die Früchte besonders Berwendung sinden sollen, und wir werden nach besten Kräsen biesen Bunschen Rechung tragen.

Fur Zwerndaumfultur werden nur die besten bierfür geeigneten Sorten verwendet mit besonderer Rücklicht auf biesenigen vorzug.

Mrajten viejen Wunigen Reconung tragen.
Bur Zwerzbaumkultur werben nur die besten hierfur geeigneten Sorten verwendet mit besonderer Rudsicht auf diesenigen vorzüg. Früchte, welche auf hochtammen nicht ibre volle Gute erreichen.
Die Psanzlöcher mussen bei onders für Hochtamme ziemlich groß, 4-5 fuß im Durchmester, gemacht werden.
Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß die Baume nur wieder so tief gepflauzt werden dursen, wie sie geftanden beiter

nanorn groon. Wir nennen hier nur einige Sorten unserer Obstsammlung, unser Baumschulen-Ratalog enthält die vollständige Aufzählung nebst Beischnen Gorten. Inch Special-Rataloge über Obstbäume 2c. stehen zu Diensten.

Menfel.

Balfaminen, welche bis jett gewonnen morden ift;

1978

constant, beimer ein jegt gewonten neteen ich; constant, bringt aber wenig Samen. 10 Korn 6 Sgr. Solferino. Blume groß, weiß mit Atlaß-glang, lifa und scharlach gestrickelt und gestreift; eine vorzügliche und effektwolle Neuheit, 10 K. 6 Sgr.

* bedeutet Tafelfrucht, + Birthicafts. Erflärung ber Beiden: * bebeutet Tafelfrucht, 7 Wittoppel, frucht, für ben zweiten Rang werben bie Beiden verboppel, ben erften Rang noch ein ! jugefügt. S. H. W. bruden bie Reif. zeit im Commer, herbft ober Minter aus. — Die vor bem Mamen ber Corte fiebenbe Bahl ift die Rummer bes Sortiments. Hochftammige Kronenbaume a St. 123 Sgr.; schwächere a St. 123 Sgr.; schwächere a St. 123 Sgr.; Sochstämmige Kronenbaume in Sorten unserer Bahl bas Schri-18 Sblr.; schwächere bas Schod 16 The Phramiben auf Wilbling verebelt à St. 72-12 Sgr.

1302 Ilex aquifolinm macrophyllum

1304 Lagerstroemia indica . .

1305 Prunus lusitanica

2½ 2½ 15

Spaliere, doppelte und einfache Schnurbaumden (Cordon double et simple) auf Doucin und Baradies veredelt à 71/2—15 Sar; gang ftarke Svaliere unserer Mabl à St. 171/2 Sgr. bis 2 Thir. Ginjahrige Berebelungen auf Bitbling in Corten unferer Babl bis ju 5 guß hobe à Cood 7 Thir.

bis zu 5 suß sobe à Schcd 7 Lölt.

4 Ananasahfel, rother, h. — 66 Alantapfel. **††W. —
7 Bohnahfel, großer (Abeinischer Bohnahfel), ††W. S. — 119 Vorzborfer, Bohnischer geftreister. **††W. 83 ebter Kinter- (Edelborfed), **!††W. 20 Herbst. *††W. 83 ebter Kinter- (Edelborfed), **!††W. 20 Herbst. *††W. 2 Zwiebel. *††W. —
1 Bürgerherunafel. ††H. W. — 5 Calvisle, Rother H. Other.
††H. W. — 70 Cittonenahfel, Winter-, *††W. S. — 72 Edenhagener, Weller's *††H. — 14 Erdberenhfel, englischer. *††H. — 14
Goldmohr. *††W. — 97 Goldszugapfel. **††W. — 102 Gradenhagener, Keller's *††H. — 14 Croberenhfel, englischer. *††H.

4 Goldmohr. *††W. — 97 Goldszugapfel. **††W. — 102 Gradenhasteiner (Gradenheiner) **††H.W. — 41 himberenhfel, langer.
†H.W. — 4 Hossindore, dopwelter. *†† W. — 36 Jungfernahfel,
böhmischer. *†H.W. — 11 Kaijer Alexander *†† H.-W. — 63 Kantsapfel, Danziger. **††H. — 22 ParadieSapfel, gestreitier Winlete. *††W.S. — 68 Parmäne, engl. Kinter-Golds **†† KorMärz. — 60 Sarster's **††W. — 28 Güsthon's. **††W. — 23 Prinzenapfel. *††H. — 55 Nambour, rether Sommers, †† Sept. Oct. —
†† Reinette, Burdandi's **††H., 69 Carmesters. **††W., 6 grade
berbit. **††H., 87 große Casseler. *†† W., 81 Saxbert's. **††W.S.
8 steine Casseler. **††W., 54 Reuporfer. **††W., 12 Kormannische.
**††H., 87 große Casseler. *†† W., 81 Saxbert's. **††W.S.
8 steine Casseler. **††W., 58 Rauser's. **††W.S.
8 steine Casseler. **††W., 58 Reuporfer. **††W., 112 säße
berbit. **H. — 3 Ridhath, gelber. **† Oct. San. — 25 Stettiner,
eiber Kinters. *††W. — 64 Etreissing, echter Winters. *††W. —

4 Strissapfel, weißer Sommers. **†H. — 77 Tassechele.

*++ W. - 65 Taubenapfel, rother. **+ W., 149 weißer Binter-**+ W.

Birnen.

Sochftämmige Aronenbaume à St. 121/2 - 20 Sgr.; gang ftarfe a St. 1 Thir.

nach unserer Mabl bas Schod 24—29 Abtr.
Phramiben und Spaliere (Birnen eignen fich nicht gut für Schnurbäumchen, Corbons), die besten, geeignersten Sorten, auf Wildstamm ober Duitte veredelt, je nach ber Stärke:
Phramiben & St. 72—20 Sgr.
Spaliere & St. 10 Sgr. bis 1 Ahr.

Außerbem befigen wir einen fleinen Borrath gang ftarter Byra. miben und Spaliere bas Ctud bis 2 Thir. Die Beichen find biefelben wie bei ben Mepfeln.

Diverse Obstsorten.

| Cuitten à St. 5 Sgr, ganz ftarke à St. 15 Sgr. Mispeln | Massniffe, sehr starfe Stämme, 3werg. (Iuglans fertilis) tra Echte Raftanien, hochstämmig niedrige, bufchige Rornesferigen . Rornesfes Rornesfes R. villosa (echte Ha |
|--|---|
| 15-20 Sor. | Obstwildling |
| . Spaliere und Corbons | Die Berichiedenheit der Prei die Stärfe der Baumchen. Apfelwildlinge, fehr ftarke, verpfl |
| " 2 jährige | Birnwildlinge, verpflanzte |
| , ganz starte nach unserer Wahl a. Et. 25 Sgr.—1 Thir. 25 Sgr. 3wergbaume für jede Form geetgnet 12% Sgr. delmisse, schöne großfrüchtige Sorten | Apfeltämme) Unterso Johannisapfel (Douein)) 3m Duitten (Unterlage für Zwerabirn |
| 23 Egir. 13 Ggr. 18 Gg | Steinweichsel (Unterlage für Rirfd |
| | |

| " Zwerg- (Inglans fertilis) trägt schon gang flein | 20 Sgr.—1 Thir. |
|--|--|
| Echte Kaftanien, hochftämmig niedrige, buschige Kornelfirschen Rojenäpfel. R. villosa (echte Hagebutte) | à St. 6 Sgr. |
| Obstwildlinge. | 20 100 1000 E Stück Stück |
| Die Berichtebenheit ber Preise bezieht fich auf bie Starte ber Baumchen. | Stück Stück |
| Apfelwilblinge, fehr ftarke, verpflanzte | 3 15/ ₆ 10 - 15 2 5/ ₆ -1 7- 11 |
| Birnwildlinge, verpflangte | 1 . 3-6 2 1 ¹ / ₂ -2 9-14 |
| Ririchenwildlinge, füße | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Sohaunidapfel (Douein)) zwergbaume. Duitten (Unterlage für Zwergbirnbaume) | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Obstorangerie.

Die Bucht der Zwergobstbaume in Töpfen nimmt wieder nach und nach ben ihr gebührenden Blat bei den Obfiliebbabern ein. Es läbendes Baum etwas Anderes, wo das Rugliche mit dem Schönen so verbunden ware wie hier. Wie niedlich sieht ein über und über ihnendes Baumchen aus, aber noch viel prachtiger ein solches mit den schönken Früchten beladen. Besonders geeignet sind bieselben für biaben gu großer Bollbommenheit bringen.

Bir halten immer eine vorzügliche Ausmahl von Aepfeln, Birnen, Kirichen, Aprilofen und Bfirfichen in ichonen, mit Rnospen verfebenen fremplaren, in Töpfen gezogen, vorrathig. Der Breis richtet fich nach ber Ctarte

Der Breis richtet fich nach ber Ctarte . . . bag Stud von 1-2 Thir. Baumchen in Gorten und auf Unterlagen, welche fich fur biefen 3wed besouders eignen. . . 12 fraftige Stamme 4 Thir.

Beerenobit.

Die vollftandige Aufgahlung unferer Sortimente, fiche Pflangen- und Baumichulen-Katalog.

Erdbeeren.

Allerneuefte.

Die Beschreibungen bei diesen Henheiten find die der Buchter.

lelle Cauchoise (Acher). Die große ober sehr große Frucht oval, lebbait firschroth mit hervortretenden Kernen; Fleisch rofa, fest, butterhaft, gezuckert, sehr fein varfämirt. Aflanze träftig; Reise mittelfrüh. Gehr enwiehlenswerthe Barietat . à Et. 228, Gyrt. octor Hogg (Bradlay). Frucht erfter Große von langlich ovaler platter Form, manchmal hahnenkammförmig, lebhaft orange-rofa mit sehr hervorstechenden Kernen; Bleisch rein weiß, voll, sest, butterhaft, saftreich, gegudert, außerordentlich reich und parfmint. Phange sehr trätig, gedrungen und außerordentlich reichtragend. Die späteske der großen Erdbeeren und dadurch, und durch ibre anderen vorzüglichen Eigenschaften eine werth-nasse Requisition

| 20 | |
|---|---|
| fräftig, sehr reichtragend. Mittlere Reifzett. Sehr embfehlenswerthe Barietät | and a seigner ich baburch au |
| Maulbeeren, schwarze großfrüchtige à St. 15 Sgr. Feigen, die besten Sorten | Weinstöcke in 60 alteren, neuen und neuesten gang vorgunt Sorten à St. 4-8 1 , recht starte |
| Zierbäume un | nd Sträucher. |
| 6 Stüd in 6 Sorten scholühender Ziersträucher unserer Wahl - Lhir. 20 Sgr. 25 , , 25 , , , 3 , 10 , , , 15 , , | 25 Stück Sträucher in 6 Sort. unferer Wahl I Ehlt. 15 50 " " 10 " " 3 " — 100 " " 12 " — 100 " " 12 " — 1000 " " im Rommel " 7 " — 1000 " 3ierbäume und Träucher in 50—100 Sorten ur A Wahl 100 A |
| Rosen. | Alleebäume. |
| Diese bilden einen bevorzugten Kulturzweig unserer Baumischulen. Der Raum gestattet uns hier nicht, die Sorten aufguführen, noch weniger sie zu beschreben und verweisen wir auf unseren Baumischulene und Pklangen Catalog, den wir gern auf Wunsch übersenben. Wir geben nach unserer Bahl: a. hochstämme von 4–6 zuß Höhe. Das Stück in 12 Sorten b. Mittelstämme 2–31z Suß höhe. Das Stück in 12 Sorten c. Wierlick wir der der der der der der der der der de | Acer dasycarpon, raubfrüchtiger Aborn Negundo, eichenblättriger Aborn Negundo, eichenblättriger Aborn Negundo, eichenblättriger Aborn Negundo, eichenblättriger Aborn Negundoes, Spis-Alporn Per later Negundoes, Spis-Alporn Negundoes, Spis-Alporn Negundoes, Spis-Alporn Negundoes, Spis-Alporn Negundoes, Spis-Alporn Negundoes, Spis-Alporn Negundoes, Rothenbert Nobel Spis-Alporn Negundoes, Rothenbert Negundoes, Spis-Alporn

| Sp. Sp. | €t. |
|---|--|
| Populus dilatata, italienische B., Byramiben-B. 10 77 Quercus cerris, türlische Eiche 20 15 , Robur, Etein-Eiche, Winter-Eiche 10, , pedunculata, Sommer-Eiche 10 Robinia Pseud-Acacia, gem. weißblüßende Atazie 12 74 , inermis, Angel-Alfazie 30 175 Sorbus aucuparia, gem. Ebereiche, Begelbeere 12 75 Tilia platyphyllos (grandifolia), Sommer-Einde, holl, Linbe 45 30 | Sgr Cotoneaster microphylla 5 5 |
| ", schmächere | ,, nana (angustifolia) |
| fehr jchön, ftart | ,, radicans fol. var. 5. Hedera (Epheu) je nach ber ©orte 2-75 Helianthemum, biverfe 4 Hypericum calycinum 3 |
| | Hypericum calycinum |
| Trauerbäume. St. | Iberis sempervirens |
| Petula (Birte) populifolia laciniata | Kalmia angustifolia 10 n 12½ Ledum angustifolium 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Caragana (Erbjenbaum) arborescens pendula | ,, latifolium |
| , arenaria (gracilis) . 10-25 Crataegus (Μείβδοτη) Oxyacautha pendula . 20 Cytisus (Βοθητεπδαπη) alpinus pendulus 15 , Laburnum pendulum | Prunus Lauro-Cerasus |
| , purpureus | Rhododendron siehe unsern Baumschnlen-Catalog. Rhodora canadensis |
| Fraxinus (Efche) excelsior pendula | Vinca, 7 Arten und Barfetaten . 2—5 Yucca filamentosa . 10 " flaccida . 74 |
| nentiscifolia pendula 22½ [lex (Setényalim) Aquifolium pendula 20 Juglans (Balluuß) regia pendula 50 Populus (Bappel) tremula pendula, ept 30 Prunus (Birtjed) avium pendula 171½ Quercus (Eiche) pedunculata pendula 45 | , flaccida . 713 . Außerdem find es alle im Sortiment aufgeführten Coniferen (mit Ausnahme von: Pinus Larix , Salisburia adiantifolia, Taxodium distichum), betreffs derer wir auf unferen Pflanzen- und Baumschnlen- Catalog aufmerkfam machen. |
| ", salicifolia pendula 20 Robinia (Afagie) Pseud-Acacia pendula | Gehölze mit besonderer Färbung bes Laubes |
| salix (Reite) aunularis (babylonica crispa) 5 ,, americana pendula, hochftämmig 15 ,, babylonica 6–8 Buß 10 | oder der Früchte. |
| , caprea pendula | 6 verschieb. Gehölze mit besond. Farbung best Laubest 1 Thr. 20 Sgr. 6 , , , , bunten Blattern 2 , , , , , , , , , , , , , , |
| Sorbus (Eberejche) aucuparia pendula . 12½ ",",", fol. aureis variegatis . 20 Tilia (Linbe) americana pendula . 30 ", argenica pendula . 45 | Sträucher für Haide- und Moorerde. |
| Trauter-Wofen 6—10 guß hoch 20—60 Ulmus (Rüfter) americana pendula 15 " microphylla pendula 15 | 6 verschiedene Sorten mit Namen 1 Thr. 15 Sgr. Azalea pontica, wohlriedende pont. Ajalie mit Knodpen à St. 10 Sgr. 17, 7, 8 on prachtvollen hohriden 6 St. nach unserer Babl 28 Thr. |
| echlings und Kletter-Sträucher. | Erica herbacea, niebrige Hafte Gel. nach inferet Zubit 25 Ger. Kalmia latifolia, breitblättrige Kalmie |
| Ampelopsis hederacea, ftarte 5 ", ftarte in Töpfen 10-20 Aristolochia Sipho. 7½ ", ftarte in Töpfen 10-30 | |
| ,, ftarfe in Töpfen | Ausdauernde Standengewächse. |
| 7% tomentosa | 12 schönblühende und bekorative Sorten mit Namen 1½ Thir. 25 bergl |
| Glycine chineusis | 100 St. im Rommel |
| Menispermum canadense | 172 084 |
| Periploca gracea | Topfnelfen. |
| Periploca graeca 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 | (Dianthus caryophyllus fl. pl.) |
| Gehölze zur Bildung immergrüner | Nuch hier verweisen wir auf unferen Baumichnlen- und Bflangen- Ratalog, welcher bie Aufgablung und Beschreibung ber einzelnen Ba- rietaten enthalt. |
| Gruppen. | Wir geben nach unferer Bahl: |
| Andromeda Catesbaei | 12 Sorten für 1 Ahr. 15 Sgr. 25 " 3 " 3 " — " 50 " 5 " 15 " |
| Aucuba iaponica hiperia Mariatitar ia nach har Galtanfait | Remontant-Reffen. |
| Buxus, diverse Arten | 4 Gorten à 1 St 25 Sgr. |
| | |

oladiolen.

Nachstebend sind die schönsten Arten und Barietäten dieser prachtvollen Iribee aufgeführt, und durfte unsere Sammlung, besonders was die wundervollen hybriten des Gl. Gandavensis betrift, die reichhaltigste Deutschlands seine besondere Sorgfalt, es genügt, sie in gut bearbeitete, Die Kultur der von Gl. Gandavensis entsprungenen dybriten verlangt gar teine besondere Sorgfalt, es genügt, sie in gut bearbeitete, vor läugerer Zeit gedungte Gartenerde zu pflauzen. Bu kompatten und kleisen Boden mögen sie nicht; am besten gebeine sie in einem noch der jungfräultiden Boden. Die Zwiebeln mehrere Zahre auf dieselbe Stelle zu pflauzen, wirtt sehr verderbendringend: wenn irgend möglich, frischen jungfräultiden Boden. Die Zwiebeln wehrere Zahre auf dieselbe Stelle zu pflauzen, wirtt sehr verderbendringend: wenn kuhdung; ist komme man nicht vor drei Zahren an denselben Ort zurück. Während dieser Zeit dungt man den Boden gehörig mit Pferde- und Kuhdung; ist der Boden sehre und kuhdung werteren.

tomme man nicht vor brei Jahren an benfelben Ort zurnd. Mährend biefer Zeit dungt man den Woden gehorig mit Pjerde- und Auhonng; ist der Boben feucht, dann mur mit dem erstern.

Um eine frübe und langdauernde Flor dieser herrlichen Pflanze zu haben, pflanzt man von Anfang ober Mitte April, je nach dem Wetter, von 14 zu 14 Tagen bis Ende Inni, in einer Entfernung von 10—15 Zoft und, nach der Größe der Zwiebeln, 2—4 Zoft tief. Fir die erste Flor von 14 zu 14 Tagen bis Ende Inni, in einer Entfernung von 10—15 Zoft und, nach der Größe der Zwiebeln, 2—4 Zoft tief. Fir die erste Flor und jedoch die stärften Zwiebeln, da diese innuer etwas früher als die fleineren blühen werden.

Um die Flor voch früher, Cude Junt, Unsang Juli zu haben, pflanzt man Jwiebeln ichon Ende Februar in Töpfe und lätzt sien alle ise aber nicht zu warm, damit sie sich nicht überwachsen; später bei Eintritt guten Wetters pflanzt man die Zwiebeln, nachem sie gehörig abgehärtet, aus den Töpfen in Freie.

Das Bezieben sie während des Wachsthung sehr nöthig, besonders, wenn sich die Blüthenstände zu entwicklin beginnen, und während der Blüthe der trocknenen beisen Wetter nie verläumt werden.

Das Begieben ist wahrend des Machsthunts sehr nothig, besonders, wenn sich die Bluthenstande zu entwicken veginnen, und wagrend ber Blütbe darf dasselbe bei trodenem heißen Wetter nie versammt werden.
Im Gerbite, wenn die Stengel absterben, nimmt man die Zwiebeln aus der Erde, bringt sie an einen trodenen, luftigen, möglichft nicht zu beizeuden, doch frostreien Ort, legt eine neben die andere und bedeckt sie mit trodenem Sand. — Für Bouquets eignen sich die gladvielen ganz vorzüglich, da die noch unentwickelten Anodpen, wenn die Alüthenstände in's Wasser gestellt werden, sich zu vollkommenen Blumen entfalten. Gruppen der Gladvicken sehen am besten aus, wenn noch andere mit ihnen barmonirende Planzen dazwischen steben, oder wenn sich dieselben an einen lebenden grünen hintergrund lehnen. Est werden nur blübbare Awiebeln abgegeben und sind für solche die Preise so niedlich gestellt. — Die Beschreibungen der einzelnen Varietäten bestuden sich un unserem Pflanzen und Baumschulen-Catalog.

Colorirte Abbitdungen recht hubider Bariciaten unferes Sortiments haben wir namentlich für diejenigen unferer werthen Kunden anfertigen laffen, welche diese reizende Blume in ihrer bewundernswerthen Bervollkommung gar nicht oder nur wenig fennen; gern senden wir die Bilder auf Bunich gratis zu.

Gladiolus Gandavensis hybridus.

Daß man bei uns die Gladiolen-Sybriden in eben der Bollfommenheit wie in Frankreich ziehen kann, davon hat fic Jeder, welche unfer Stegliger Etablissement mabrend der Blütbezeit derselben besuchte, überzengt. Außerdem hatten wir in der Aussitellung bes Acclimatisations unfer Stegliger Etablissement während der Blütbezeit berfelben besucht, auch ein Sortiment von 163 Barietaten in vollkommen entwickelten Blüthem gerählt werden in der legten halfte des September stattfand, noch ein Sortiment von 163 Barietaten in vollkommen entwickelten Blüthem ftänden ausgestellt, tropbem der vergangene Sommer gerade nicht zu ben günstigsten gezählt werden konnte.

| Neuheiten fü | ir 1868. |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

| ©t 202 Alexander | 64 209 La Favorite . 23 110 La Fiancée 55 111 Léonora | ©td. Sqt 22½ 22½ 555 11½ 23 23 | 117 Princesse Affice | 55 35 64 | 124 Urania | |
|------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|------------|--|
| 206 Etendard | 55 11½ 113 Molière | 23 | 119 Semiramis | 64 | | |

Neuheiten bes Jahres 1867.

| 190 Ad. Brogniart | 194 Félicien David (S.) 23 195 Lady Franklin (S.) | 1 197 Princesse Marie de Cam- | 199 Sir William Hooker (S.) . 4 200 Th. Moore (S.) |
|-------------------|--|-------------------------------|---|
|-------------------|--|-------------------------------|---|

Barietäten früherer Jahrgange.

(Auswahl ber befferen Gorten.)

| | (Ausmabl ber be | fferen Gorten.) | |
|-----------|----------------------------|---|----------|
| 1 Achille | (Musumbl ber be 32 Diane | 63 Impératrice 2 64 "Eugénie 24 65 Isoline 3 66 James Carter 18 67 "Veitch 18 68 "Watt 14 69 Janire 2 70 Jeanne d'Arc 6 71 John Bull 6 72 "Waterer 24 73 Junon 18 74 Keteleêr (Truffaut) 3 75 Laelia 3 76 La Quintinie 10 77 Le Dante 18 78 Le Ttiten 24 79 Léonard da Vinci 18 78 Le Ttiten 18 79 Léonard da Vinci 18 70 Le Poussin 10 71 Linné 18 72 Lord Granville 7 73 "Raglan 6 74 "Byron 2 75 L'ornement des parterres 12 75 L'ornement des parterres 12 75 Louis van Houtte 2 75 Mac-Mahon 6 75 Madame Basseville 10 | 118 Mars |
| 29 Danaé | 61 Hébé | 92 , de Sévigné 18 93 , de Vatry 10 | |

62 Hector . . .

| C+A I | |
|--|---|
| Std. Sept | 15 |
| (Se | orginen. |
| Unfere Cammlung besteht nur ans vorzüglichen Gorten, von übrigen nebst Beschreibung enthalt unfer neuer Rifaugenfatalng, Gnerie | benen wir hier die nenen bes bergangenen Jahres aufführen; bie iftataloge ber Georginen-Sammlung fteben anch zu Dienften. |
| I. Großblumige. 2 Amateur Rosé (Bruant). Blume groß, gut gebaut und von guter Hattung, schaftach-orange, niedlich mit goldzelb gespitt; manchmal it ein Theif der Blumenblätter mit einem goldzelben Rodde, wie gewisse Gamessten, geziert (4) 33 Carlotta Ferrand, gelbschamois marmorit, blutroth gespritt und gespritt (4) 44 Comtessa Sussia Mazuchetti, camois mit carmossin gespritt (4) 55 Ceutscher Turnergruß (Sck.), carmossinbraum, abwechselnd mit weißen Sviken (3) 50 Ceutscher Solbson (3) 50 Ceutscher Solbson (3) 50 Ceutscher Goldsonigin (Sck.), sconnossinbraum, abwechselnd mit weißen Sviken (3) 50 Ceutscher Goldsonigin (Sck.), sconnossinbraum, abwechselnd mit weißen Sviken (3) 50 Ceutscher Solbsonigin (Sck.), sconnossinbraum, abwechselnd mit weißen Sviken (3) 51 Ceutscher Goldsonigin (Sck.), sconnossinbraum, abwechselnd mit weißen Goldsonigin (3) 52 Ceutscher Goldsonigin (Sck.), scolbsonigelb mit lackrother Blume (4) 53 Ceutsche Goldsonigin (Sck.), scolbsonigelb mit lackrother Blume (4) 54 Ceutsche Blume (4) 55 Ceutscher Blogel v. Falsenstein (Sck.), bellseuercarmossin mit bellsassen (4) 56 Ceneral Bogel v. Falsenstein (Sck.), bellseuercarmossin mit bollige contantem, katcanien und schwarzbraunem Centrum u. blassen Rand (4) 56 Ceneral v. Molfte (Sck.), leuchtend meinigzinnober mit bellsasselbseibem Rand, prächtig (3) 57 Ceneral v. Molfte (Sck.), leuchtend meinigzinnober mit bellsasselbseibem Rande. Prachtig (3) 58 Cestreiste Rose (Sck.), meiß mit tila, bellsund duntelcarmindiol gesprenselbseiben Rande. Prachtung (4) 58 Cestreiste Rose (Sck.), meiß mit tila, bellsung und reicher Kord und schwarzstan (4) 59 Cestreiste Rose (Sck.), seip schwarzstan gespen hat hattarbeneum Caume, bier wie der gespen hat hattarbeneum Caume, bier mit dare gespen hat hattarbeneum Caume, bier mit dare gespen hat hattarbeneum Caume, bier mud da eine Blume mit Reischarbe duntelgelbsicher, lia puriokes Schwerzschen. Eine prachtvolle Georgine (5) co. de generale (5) co. de generale (5) co. de generale (5) co. de generale (| zeichnet (2) 216 General Tom Thumb, bunket-ijabelle auf scharlach-orange Gunto. 256 General Tom Thumb, bunket-ijabelle auf scharlach-orange Gunto. Sebr reich blibend (24) 217 Hofgürtner E. Neinhardt (Sek.). Hellzinnober mit goldgelbem Rand; prächtig (115) 218 Berte (Mard.), rein weiß (2) 219 Pipin (Mard.), lisa (2) 220 Prinzeß Alice (Mard.), vrächtig rosa, sobr schare Bau. Sie ift unendlich eich blibend und entspricht seder Ansoberung, welche man an eine schöne Georgine stellen kann (2) 221 Furgegrüftst (Sek.), belgitnober mit goldgelb; prächtig (135) 222 Zwergsfrüft (Sek.), belgitnober mit goldgelb; prächtig (135) 25 Zwergsfrüft (Sek.), belgitnober mit goldgelb; prächtig (135) 25 Zwergsfrüft (Sek.), belgitnober mit welßen Spigen (2). 111. Listputen. (Beuquet-Georginen.) |

| | × · |
|--|--|
| Kuchsten, | Crocosmea (Tritonia) aurea 12 St. 24 Sgr. Std. 3 Sg |
| Outlinest, | Dahlia imperialis |
| Tweby'ider Collection vereinigen Alles, was man von guten Guchsten verlangt. 16 Corten, jebe Ehlr. 5 Ggr. | Diplacus, 4 Sorten, jede 6 Sgr., 12 St. in 4 Sort. 1 Thir. |
| Alle 16 Sorten 2 , 5 , | Eryanthus Ravennae, riefiges Gras |
| Neltere und neuere nur erprobte Gorten: 12 St, mit Namen für 1 Thir Sgr. | Hendersonii 12 " 24 " " 8 " |
| 25 " " " " 1 " 25 " | Diplacus, 4 Sorten, febr 6 Sgr., 12 St. III 4 Sort. 1 294. Eryanthus Ravennae, riefige8 Graß |
| 12 " opne " " — " 25 " | marie Belanger |
| 25 ,, ,, ,, 3 ,, -, ,, | Ferdinanda eminens |
| 03 .Y | Gazania splendens 12 St. 1 Ehlr. 20 Sgr. " 5 " |
| Pelargonien. | Farfugium grande Ferdinanda eminens Gazania splendens 12 ©t. 1 % fir. 20 ©gr. " 5 " "", fol. var. 12 " 1 " 10 " " 5 " Gnaphalium lanatum 12 " 1 " 10 " " 5 " Gynerium argenteum (Bampasaras) 12 " 2 t. 2 % ir. " 75 " Gynerium 1 genteum (Bampasaras) 12 " 5 t. 2 % of 6 % ortent 1 % bit." " 75 " |
| Großblumige (Englische und Obier'sche). | Gynerium argenteum (Pampasgras) . 12 St. 2 Thir. " 74 " |
| Die Befdreibung und Aufgahlung der einzelnen Bartetaten unferes | Heliotropium, neue 6 St. in 6 Sorten 1 Lbir. " 6 " |
| Cortiments fiebe Pflanzen-Catalog. Englifche, neue | , altere ichone Sorten 6 , " 6 1" St. 25 Sgr. " 4 " Koniga variegata, Einfassungspflanze 12 St. 25 Sgr. " 3 " |
| Hellette | Lantana, neuere und neuefte |
| 71/ | ältere 10 " " 10 " 1 " - " " 4 " |
| neueste " 10 " | , altere 10 " " 10 " " 10 " " 4 " Leucophyta Browni 12 St. 1 " 10 " " 5 " 12 St. 24 Sqrt 25 " 25 " 25 " 25 " 25 " 25 " 25 |
| Geftreifte Doier neueste "10", Diadematum Pelarg., ältere "7½", neue "7½", 1 | Lippia repells |
| Diadematum Pelarg., ältere | "Erinus 8 Barietaten, jebe " 3 " |
| Fancy (Fantasie) Pelarg | Lophospermum scandens punctatum |
| | Maurandia Parklayana Ichone Cominandanie |
| Pélargonium zonale et inquinance. | |
| Sind in neuerer Beit ungemein vervollfommnet worden; die Farben | men, wo ber Reich fo groß wie die Blumenfrone und ebenfo gefarbt ericeint . 12 St. 224 Sgr. |
| find viel reicher und mannigfaltiger als fruber, die Blutbenftande haung | Nicotiana Wigandioides |
| von ber Größe einer horrenfienblume. Reine andere Blume fann biefe als Gruppen-Blorblume erfegen. | frutescens 6 1 5 |
| Reaton Hybriden | Panicum plicatum u. sulcatum 12 St. 1 2 ptr. 15 Sgr. " 5 " |
| Reue diverse Budhtungen ber Jabre 1866 u. 1867, jede Sorie und Stud | Pentastemon, neueste bes Jahres 1867 |
| Rarietaten früherer Rahre 12 St. in 12 Sort. 1 Ebir. 7% " | Titana Shana Garten |
| 25 " " 25 " 2 " 10 " | 12 St. in 12 Sort. 1 Thir. 15 Egr. |
| Gefülltblühenbe: Auguste Ferrier 7½ Sgr. — Gloire de Nancy 12½ Sgr. — Martial de Chamdour 6 Sgr. — Ranunculifiona | Petunien 12 Bartetaten, jebe " 5 " 12 St. in 12 Sorten 1 Ehlt. 20 Sgr. |
| 12% Gar. — Martial de Chamflour 6 Ggr. — Ranunculiflora plenissima 7% Ggr. — Surpasse Gloire de Nancy (1867er Reu- | Phormium tenax |
| helt) 211 Gar | Pilogyne snavis |
| Musthfättrige. Italia Unita 20 Gar Mrs. Pollock 15 Gar | Pilogyne snavis . Poa trivialis argentea elegans, ein prächtiges Poa trivialis argentea elegans, ein prächtiges |
| Quadricolor 124 Sgr. — Sunset 15 Sgr. — Aeltere Sorten 6 St. in 6 Sorten fur 25 Sgr. | neues Grav, beffen Dinitet fruit tein weit ge- |
| | Saccharum egyptiacum, ein neues Buderrohr; fur |
| Auswahl von Gewächsen, | Gruppen prachtvoll 22% " Selinum decipiens, Blattpstanze mit gesiebertem Blatte " 6 " |
| welche fich jum Bepflanzen von Gruppen ze. eignen. | Solanum 6 Sprien a 1 St. 1 Luit. 3 Sgt. " 3 Sol |
| | Thladiantha dubia, thouselaubte collinguitante " " " |
| Achyranthes Verschaffeltii 12 St. 15 Sgr., à St. 2 Sgr. | Uvaria |
| Agapanthus umbellatus | ", ,, grandiflora |
| ,, ,, Iot, Variegatis, itsu | ninnatifida |
| | Warhang naueste Mudstellunge Berbenen. |
| Andropogon formosum Antirrhinum 6 @ort. 15 @gr. " 5 " Bouwardia 6 " 22 " " 4 " Calceolaria, [trandurtiae 7 " 25 " 25 " 25 " 25 " 25 " 25 " 25 " | Anatole Leroy (Bruant) 12 St. 2 Thr. 10 Sgr. , 8 , |
| Bouwardia | Madame Lemoine . 12 " 2 " 10 " " 8 " Non plus ultra 12 " 3 " 5 " " 10 " |
| Calceolaria, stranchartige | " andere prachtivolle Sorten bes Jahres 1867: " 12 St. in 12 Sorten 1 Thir. 5 Sgr. |
| 2 C. Married 19 Ct. 1 | 100 " " 25 Bariet. 8 " |
| Come (My manually) was in mach her Golfenheit & Got 1 Shir 5 Golf. | " schönfte Corten früherer Jabre: 12 St. in 12 Corten 1 Thir. |
| 12 ältere gute Gorten 1 Lhr. 25Gfr. | 100 - obne Namen 6 " |
| 12 âltere gute Corten 1 Lhfr. 25 Ggr. 12 Ctud im Rommel 1 Centaurea candidissima vera 12 Gr. 2 Lhfr. à Gtd. 6 " | Veronica neueffe Imperiale |
| Chrysanthemum indicum, neucste bes Jahres 1867. 10 Gorten 2 Thir. à Std. 7% " | Madaine Nardy |
| | 12 St. in 12 Sorten 1 Lytt. 15 Sgt. |
| Colocasia (Caladium) nymphaefolium 12 St. 1, 20 , à St. 5 , | Wigandia caracasana |
| " ältere, 12 St. in 12 Scrt. 1 251r. 7% Sgr. Colocasia (Caladium) nymphaefolium 12 St. 1, 20 , å St. 5 , Cordyline australis å St. 10 Sgr. — 1 251r. 10 , Cosmophyllum cacaliaefolium å St. 5 , | gehenbe Art |
| | |
| Einige Ano | llengewächse. |
| Emily stub | mengenennje. |

| | Anem | U. | H | | C | UL | U. | H | IL | Ia. | | | | |
|--------------|--|-------|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|------|--------|--------------|------|---|
| The mount | erlangen einen ti eln werden im L em Einpflanzen | 17:00 | 4.0 | 6 : | 201 | 1 134 | 4031 | 1 17 | 220 | *) × | 011 11 | PT OP | PAT. | |
| e in gequell | t. | | | | | | | | | | 100 | Stck. Sgr | St | |
| Schönfter | Rommel, gefüllt " fcarlach . | | | | | | | | | | 1 | 15 | 7. | 9 |
| 11 11 | " jcharlach . | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | • | ۰ | ۰ | | 1 | 15 | | 9 |
| H H | einfach | | | | | | ٠ | | | 10 | 1 | 25 | | 9 |
| n n | " fcarlach | ٠ | ٠ | ۰ | ۰ | ٠ | ٠ | | ٠ | • | | 23 | | 0 |

| | 100. | Stck. Sgr | Sgr. N |
|--|------|--------------|--------|
| Admiral Zoutman, blau | 2 | | 1 . |
| Agnarius, weiß, groß, gefüllt | 1 | 15 | . 8 3 |
| Azur incomparable, bunteiblau, gefüllt | 2 | 20 | 1 |
| Feu superbe, scharlach, gefüllt | 1 | 20 | . 7 |
| Feu incomparable, icharlach und weiß, gefüllt | 1 | 25 | 1 . |
| L'Eclair, icharlach, grob, gefüllt, prachtvoll | 2 | 15 | 1 . |
| Couleur de sang, roth, nen, gefüllt | 1 | 25 | 1 . |
| Lord High Admiral, icharlach, neu, gefüllt | 2 | 10 | 1 . |
| Rose surpassante bunt aefullt | 1 | 25 | 1 . |
| Anemone appenina | 2 | 20 | 1 3 |
| | | | |

1100 Std. | Stad |

| | 100 | Se cette | 90 F | min | 114.00 (74.4 + 74.7 + |
|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|---|
| | TH | Sgr | Sgc | Phy | 100 Std. Stack |
| Anemone Nemorosa fl. pl. " fl. roseo pl. " Hepatica fl. albo " fl. rubro | 2 2 13 13 | 20 20 7½ 7½ | 1 1 4 4 | 3 6 6 | Soucis doré 2 10 1 Seraphique d'Alger, citronengelb 2 10 1 Curban d'or 25 6 6 25 6 6 25 6 6 25 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| " fl. rubro pl | 11 | | 3 14 | 9 | noir 22½ . 6 |
| Ranunkeln, gefüllte. | | | | | Ranunculus asiaticus superbissimus, practi- |
| gehandlung im freien Lande wie bei den Anemonen. Jarmoisi superde, karmoilin Janalière, dunfelmoth Janalière, dunfelmoth Jenishere, den Allender, fichwarz Jerishind der Viederlande, fichwarz Jerishind der Wiederlande, fichwarz Jerishinder, jchwarz, ertra Johir, gelb und fichwarz gefledt Jrange brillant, gelb und fichwarz | 2 2 2 2 2 3 2 2 | 15 15 10 10 10 10 | 1 1 1 1 1 1 1 | | voll; Beschreibung siehe Seite 18 diese Kata- logs 25 St. 1 Khlr. 15 Syr., à St. 2½ Sgr. Cyclamen Atkinsii (ibericum) album |
| Türkische | | | | | " album, gang neu 1 Ehfr. 5 " " Neapolitanum |
| armin Turban lercules, weiß ferveilleuse, gelb omano, jфarlaф | 2 2 | 10 7½ 25 20 | 1 1 | 6 6 | persicum (Aleppicum) 5-26 |
| | | - | - | | |

Den Andzug and unferem Pflanzen- und Baumichulen Catalog weiter audzudehnen, gestattet und hier der Naum nicht, überfenden auf Bunfch wir gern das genannte, 84 Geiten umfaffende, die meiften Pflanzen beschreibende und mit rattifchen Bemerfungen verfehene Bergeichnift.

Grasfamen für Gärten.

| | 20d. | Sgc. | Sgr. | | 100 Thl | Sgr. | Sgr | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|------------|-----------------------------|--|-----|
| vena elatior, französisches Raigras | 9 18 13 25 22 20 | 15 15 15 15 | 3 3 7 5 9 8 7 4 7 | 6 | 6 9 | 15 : : : : : | 2 2 3 3 4 4 9 8 10 14 | 6 6 |
| | | | | | | | | |

Bast in vorzüglicher Qualität à Pfund 8 Sgr.

sartenmeffer mit gebogener Klinge, in verschiebener Größe und Qualität, das Sud 1634, 201/2, 21, 241/2, 25 Sgr.; einz facher, 141/2, 151/2 Sgr.; geringe Qualität, 11 Sgr.; elegant, Beft nach der inneren Hand geformt, febr bequem, 1 Spr. 14 Sgr.; Gartenmeffer mit langem heft, der bintere Leil vesseleben dient beim Berfegen, wie auch aum Auflodern der Erde bei Lophpilangen, 261/4 Sgr.; Gartenmeffer, mit Zäge, 27 Sgr.; Gartenmeffer, enthält: große Klinge, Säge, Wartenmeffer, Deulirmeffer mit Kartseber, 1 Lehr. 181/2 Sgr.
Julirmeffer no Kortzieber, 1 Lehr. 181/2 Sgr.

Ni

Jeulirmester, 121/, Sgr. mit Neussiber-Beschlag, 151/4; englis iche Korm, 131/5, Sgr., bieselbe in Glsenbein, 1 Khr. deller der Beredelungsmester, 161/2, Sgr.; mit Reussiber-Beschlag, 191/4, Sgr.

biropf, aber Verebeliungsmeiler, 121, Sgr., 14 Sgr.; belgifche Form, 153, Sgr., diefelbe in Elfenbein, 1 Thir. 11/2 Sgr., nach Tiebenfreund 18 Sgr.

trauben cheere, 12½, Sqr.. Nofen: ober Gartenscheere, 20½, Sqr., 24½, Sqr., 27 Sqr., 1 Lhir. 6¼, Sqr., 1 Lhir. 14½, Sqr., 1 Lhir. 18½, Sqr., 1 Lhir. 26 Sqr.

langenicheere, auf einer Stange zu befestigen, um Zweige, Ebelercifer, Naupennester z. in der Höhe abzuschneiben, 1 Thr. 10 Sgr., bessere, 1 Thr. 26 Sgr. bags der Rockenschere, 1 Thr. 28 Sgr., bessere, 3 Thr. 71/2 Sgr., baumfägen ohne Bogen. Kleine Ast. ober Nebiage, 91/2 Sgr., etwas größer 161/2 Sgr. Baumfäge mit nach der Hand ges

formtem Griff, 263/, Ggr. Cage jum Bumachen, in ber

Taiche ju tragen, frangofische Form, 1814, Sgr. Baumfäge mit Bogen. Sobenheimer, 241, Sgr. jum Dreben bes Blattes, 1 Thir. 15 Sgr.

Stattes, i. 1917. 10 sgr. Zpargelitecher vorziglicher Dualität, 18 Sgr. Zbargelitecher vorziglicher Dualität, 18 Sgr. Abfibrecher, Apfelbrecher, sehr praktijch, 28 Sgr., amerifanischer ohne Zähne, 14 Sgr.; Birnenbrecher, sehr elegant, Aufir 12 Sgr., Hacke und gabelsörinige Hane, 16½ Sgr., Karfthacke jum Reinigen und Vodern des Bobens dienendo, 28 Sgr. Gabel jum Uniskrauten (Musgaten), 19½ Sgr. Phanzenkelle jum Berseigen der Säulinge, 14 Sgr. Zbazierkoff mit Reil und Kacke.

Spagierftoch mit Beil und Sammer ober mit Beil und Sache. 2 8 hir.

Grafcheere, um ben Rafen icon gleich zu schneiben, wie solches in England üblich, 4 Thir. 20 Sgr., etwas anders geformt um die Kanzten zu schneiben, 3 Thir. 16 Sgr.
Thermometer, sogenannter Cylinder, 121/2 Sgr.
auf holz mit Rugelbebedung, 20 Sgr.
Dr. Gräf's unauslöschliche Etiquetten: Dinte à Flasche nebst


Gebrauchsanweisung, 10 Sgr. Kaltflüffiges Baumwache nach Borfcrift bes Dr. Lucas, 1 Afb. in Blechbuchs, 16 Sgr. 1/3, Biund in Blechbuche, 12 Sgr. Keimplatten, die Keinfraft der Samen zu erproben, nebst Ge-

braucheanweifung: à Stud 5 Ggr.

Mummerhölzer Plumenftahe

| | At willing the | | , . | | | | | | | |
|--------------|----------------|------|------|------|-----------|------|------|---|------|----|
| Blumenstäbe | Lange Buß: | 1 | 11/2 | 2 | $2^{1/2}$ | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 |
| | pr. Schf. Sgr. | 21/2 | 3 | 31/9 | 41/2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| Rummerhölzer | Lange Boll: | 41/2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | | | |
| | pr. Schf. Sgr. | 11/4 | 2 | 21/2 | 3 | 51/2 | 10 | | | |

Etablissements für Landwirthschaft, Forstwirthschaft u. Gartenbau



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)